

Regard santé

l'aire d'Abbeville

→ Présentation de l'aire

L'aire d'Abbeville comprend un seul canton, situé dans le département de la Somme.

Au recensement de 2006, cette aire compte **30 620 habitants**, soit une densité élevée de 274,7 habitants au km², contre 91,5 h/km² dans le département, 97,6 h/km² en région et 112,9 h/km² au niveau national.

Cette population compte plus de **personnes de 75 ans et plus** que dans la population régionale (respectivement 7,4 % et 6,6 %) mais autant que dans le département et qu'au niveau national (7,3 % et 7,7 %).


Les **moins de 25 ans** sont aussi nombreux dans l'aire (33,1 % de la population) que dans la Somme (32,7 %) et qu'en Picardie (33,1 %) mais plus nombreux qu'en France métropolitaine (30,9 %).

En 2003-2006, l'aire d'Abbeville présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 1,96 enfant par femme, ce qui est plus élevé que dans la Somme et qu'en France métropolitaine (respectivement 1,82 et 1,90), mais moins élevé qu'en région (2,00).

En tout, ce sont 1 577 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 17,1 pour 1 000 sont le fait de mères mineures (contre 10,2 %, dans la Somme, 9,6 % en Picardie et 5,7 % en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, les 1 621 naissances dont les parents résident dans l'aire se sont passées à Abbeville pour 90,1 % d'entre elles et pour 7,4 % à Amiens.

De même, les décès concernant les habitants de l'aire sont constatés à Abbeville pour 84,3 % d'entre eux. Amiens et Boves viennent ensuite avec 6,4 % et 3,4 % des décès.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie

Service Médical
Nord Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales


Des taux élevés de bénéficiaires de l'aide ménagère et d'allocataires du RMI

Plus de la moitié des foyers fiscaux de l'aire est **non imposable** en 2005 (55,7 %), ce qui est plus que dans la Somme (50,8 %), la Picardie (47,8 %) et la France métropolitaine (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 14 171 € en 2005, ce qui est inférieur à la Somme (15 076 €), à la Picardie (15 938 €) et à la France métropolitaine (17 165 €).

L'aire d'Abbeville compte 49,8 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est supérieur aux taux des zones de références (20,5 ‰ dans la Somme, 21,3 ‰ en Picardie).

Par contre, l'aire étudiée compte moins de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie (APA)** à domicile (141,4 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en 2005) que la Somme (153,0 ‰) et la France métropolitaine (149,4 ‰), mais plus que la Picardie (117,7 ‰).



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

En 2005, l'aire d'Abbeville compte 1 767 **demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)** de catégorie 1.

Les DEFM de l'aire sont 25,2 % à avoir moins de 25 ans (contre 25,9 % dans la Somme et 24,8 % en Picardie) et 10,9 % à avoir 50 ans et plus (contre respectivement 12,0 % et 13,6 %).


En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté est faible : 32,9 % des DEFM de catégorie 1 de l'aire, contre 38,5 % dans la Somme et 33,9 % en Picardie.

L'aire compte nettement plus d'allocataires du **revenu minimum d'insertion (RMI)** que les autres entités géographiques : 70,0 allocataires pour 1 000 ménages en 2004, contre moins de 50 ailleurs (49,5 ‰ dans la Somme, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine).

Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus élevés dans l'aire (respectivement 199,1 pour 1 000 familles monoparentales en 2004 et 30,6 pour 1 000 couples) que dans la Somme (147,2 ‰ et 17,8 ‰) et la Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

De même, le taux de Rmistes parmi les 25-49 ans est de 61,8 pour 1 000 personnes de 25-49 ans dans l'aire, contre 41,3 % dans la Somme et 33,4 % en Picardie.

2



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

La **CMU de base** concerne dans l'aire d'Abbeville 22,4 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005, contre 24,9 ‰ dans la Somme, 16,1 ‰ en Picardie et 22,1 ‰ en France métropolitaine.

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire se situe au-dessus des taux de référence (153,4 pour 1 000 habitants en 2005 contre 105,1 ‰ dans la Somme, 89,6 ‰ en Picardie et 67,5 ‰ en France métropolitaine).

→ Professionnels de santé

Des densités de médecins généralistes et de spécialistes élevées

En novembre 2006, l'aire d'Abbeville compte 45 **médecins généralistes**, soit une densité de 14,9 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est plus élevée que celles de la Somme (12,0), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Parmi les généralistes de l'aire, 26,7 % sont des femmes, ce qui est moins qu'ailleurs (28,6 % dans le département, 27,6 % en région et 29,4 % au niveau national).

La moyenne d'âge des généralistes est de 49,2 ans. Cette moyenne est supérieure à celle de la Somme (48,0 ans) mais inférieure à celles de la Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans).

Quinze d'entre eux ont 55 ans et plus, soit 33,3 % de l'effectif de l'aire (28,8 % dans le département, 31,5 % en région et 32,3 % en métropole).

L'aire compte 61 **médecins spécialistes** en novembre 2006, soit une densité de 20,1 spécialistes pour 10 000 habitants. Cette densité est très nettement supérieure à celles de la Somme (6,0), de la Picardie (5,2) et de la France métropolitaine (8,8).

Les spécialistes de l'aire ont en moyenne 51,6 ans (50,4 ans dans le département, 52,0 ans dans la région et au niveau national) et 37,7 % d'entre eux ont 55 ans ou plus (contre respectivement 30,6 %, 37,1 % et 39,3 %).

Dix d'entre eux sont des femmes, soit 16,4 %. Cette proportion est plus faible que dans le département (27,6 %), la région (26,6 %) et qu'au niveau national (32,7 %).

En avril 2007, 18 **chirurgiens dentistes** sont installés dans l'aire d'Abbeville, soit une densité de 5,9 chirurgiens dentistes pour 10 000 habitants de l'aire contre 3,6 dans la Somme, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine.


La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 44,6 ans, ce qui est plus jeune que les moyennes départementale (48,7 ans), régionale (48,2 ans) et nationale (47,8 ans). Ceci se retrouve donc parmi les 55 ans et plus (3 dans l'aire) puisqu'ils sont proportionnellement moins nombreux dans l'aire (16,7 %) que dans la Somme (29,2 %), la Picardie (30,1 %) et la France métropolitaine (29,0 %). Parmi ces 18 dentistes, 5 sont des femmes, soit 27,8 % de l'effectif.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) sont 57 dans l'aire en avril 2007. La densité est de 18,8 auxiliaires médicaux pour 10 000 habitants, ce qui est plus élevé que dans la Somme (16,0) et la Picardie (13,8), mais moins élevé qu'en France métropolitaine (21,9).


Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (73,7 %), ce qui est plus important que dans les autres entités géographiques (entre 69 % et 72 %). La moyenne d'âge est de 42,1 ans (contre 42,9 ans dans la Somme, 43,5 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine) ; seuls 9 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus.

L'aire d'Abbeville a une densité de 7,9 **infirmiers** pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 24 infirmiers), ce qui est inférieur aux niveaux départemental (8,2) et national (11,2) et proche du niveau régional (7,1). La grande majorité des infirmiers sont des femmes (91,7 %). La moyenne d'âge est de 46,9 ans (45,2 ans dans le département, 44,6 ans en région et 44,9 ans au national) et 8 d'entre eux ont 55 ans et plus.

On recense 12 **pharmacies** sur l'aire en 2004, soit une densité de 3,9 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est plus forte que dans la Somme (3,5) et la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S



Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 83,5 % des patients ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein de l'aire d'Abbeville.


En ce qui concerne les autres professionnels de santé tels que les ophtalmologues, gynécologues et dermatologues, les patients vont également à Abbeville (78,0 % des consultations d'ophtalmologues, 78,7 % des visites chez un gynécologue obstétricien, 91,8 % pour les gynécologues médicaux et 81,4 % pour des dermatologues).

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire d'Abbeville est de 71,9 ans pour les hommes et de 80,8 ans pour les femmes. Ces espérances de vie sont plus faibles que dans le département (73,9 ans et 81,6 ans) et la région (74,1 ans et 81,7 ans).

Comparé avec la France métropolitaine (75,9 ans et 83,2 ans), des écarts importants se marquent. En effet, les hommes de l'aire d'Abbeville ont 4 ans de moins de vie en moyenne. Les femmes ont un écart moins grand que les hommes avec la France métropolitaine mais celui-ci reste important : 2,4 ans.



En 2000-2004, l'aire d'Abbeville connaît une **mortalité générale** de 1 114,9 pour 100 000 habitants, soit 327 décès par an. Cette mortalité est plus importante que dans la Somme (1 055,8), la Picardie (1 052,7) et la France métropolitaine (911,3).

Pour ce qui est de la **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans), elle est plus forte dans l'aire (337,0 pour 100 000) que dans la Somme (275,9), la Picardie (262,7) et qu'en France métropolitaine (221,5).

Plus de la moitié des décès survenant dans l'aire d'Abbeville en 2000-2004 est le fait des **tumeurs malignes** et des **maladies de l'appareil circulatoire** (54,3 % des décès masculins et 56,7 % des décès féminins).

Les hommes sont davantage touchés par les tumeurs malignes (34,4 % des décès masculins et 23,5 % des décès féminins) tandis que les femmes sont plus concernées par les maladies de l'appareil circulatoire (30,8 % des décès féminins et 24,5 % des décès masculins).

En troisième position, les **causes externes** de mortalité (comprenant les accidents et suicides) comptent pour 9,5 % de l'ensemble des décès féminins et pour 11,7 % des décès masculins.

L'aire d'Abbeville affiche un taux de mortalité par **suicide** plus élevé qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (32,7 pour 100 000 contre 23,1 et 18,0).

De même, les **accidents de la circulation** engendrent une mortalité supérieure aux taux régional et national (16,9 pour 100 000 habitants contre respectivement 14,3 et 10,8).

En 2004-2005, 8 887 **séjours hospitaliers** ont été comptabilisés annuellement pour des habitants de l'aire d'Abbeville, soit un taux de 294,6 séjours pour 1 000 habitants (contre 273,9 ‰ dans la Somme et 289,3 ‰ en Picardie).

Concernant les **nouvelles admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales pathologies, pour les femmes comme pour les hommes. À elles deux, elles totalisent 44,5 % des nouvelles admissions.

Le **diabète** compliqué induit à terme des affections neurologiques, ophtalmologiques, rénales ou cardiovasculaires. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux de bénéficiaires d'ALD de l'aire pour diabète compliqué (82 nouveaux cas annuels entre 2004 et 2005, soit un taux de 278,3 pour 100 000 habitants) est inférieur à ceux de la Somme (284,7) et de la Picardie (311,4), mais devance celui de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	80	29,2	1	79	29,5	1
Diabète	38	13,8	2	44	16,6	2
Hypertension artérielle sévère	28	10,2	3	17	6,4	5
Affections psychiatriques longue durée	20	7,3	4	16	6,0	6
Maladie d'Alzheimer et autres démences	20	7,3	5	8	3,1	8
Pathologies cardiaques graves	18	6,5	6	23	8,8	3
Maladie coronaire	12	4,4	7	20	7,3	4
Artériopathies chroniques graves	8	2,8	8	13	5,0	7
Polyarthrite rhumatoïde grave	6	2,1	9	3	1,0	14
Insuffisance respiratoire chronique grave	6	2,0	10	8	3,0	9
Maladies chroniques active du foie et cirrhoses	3	1,2	15	5	2,0	10
Autres causes de nouvelles admissions	36	13,2	-	30	11,4	-
Total	275	100		267	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des taux d'admissions en ALD moins élevés pour les pathologies cardiaques graves et les maladies coronaires

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 146 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) se répartissant en 75 admissions pour les hommes et 71 pour les femmes, soit un taux de 495,6 pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux de la Somme (556,7), de la Picardie (602,0) et de la France métropolitaine (586,1).

En 2004-2005, 819 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire ont été le fait de maladies cardiovasculaires (en diagnostic principal), soit un taux de 26,8 pour 1 000 habitants (26,8 ‰ dans la Somme et 27,8 ‰ en Picardie).

La mortalité de l'aire d'Abbeville pour ces pathologies est de 308,7 pour 100 000 en 2000-2004 (90 décès par an), ce qui est moins élevé que la Somme (316,6) et la Picardie (314,2) mais plus important que pour la France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné annuellement, en 2004-2005, 163 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire, ce qui représente un taux de 5,3 pour 1 000 (5,4 ‰ dans la Somme et 6,1 ‰ en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (25 décès annuels) est de 87,1 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est équivalent à la Somme (87,3) et à la Picardie (86,6), mais supérieur à la France métropolitaine (74,6).

Annuellement, entre 2004 et 2005, 8 personnes de l'aire d'Abbeville ont bénéficié d'une admission en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (5 femmes et 3 hommes). Le taux de bénéficiaires d'ALD dans l'aire (25,8 pour 100 000) est inférieur à ceux du département (55,9), de la région (56,1) et de la France métropolitaine (60,5).

En 2004-2005, 70 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire sont liés à des maladies cérébrovasculaires, soit un taux de séjours de 2,3 pour 1 000. Ce taux est plus faible que les taux départemental (2,5 ‰) et régional (2,8 ‰).

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales (18 décès annuellement entre 2000 et 2004, soit un taux de 60,3 pour 100 000) est plus faible que dans la Somme (67,8), qu'en Picardie (69,6) et qu'en France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 41 nouvelles admissions en ALD par an entre 2004 et 2005 (23 pour les hommes et 18 pour les femmes).

En taux, cela représente 139,6 bénéficiaires de l'ALD pour 100 000 habitants en 2004-2005, ce qui est moins important que dans les autres entités géographiques.

Pour la **maladie coronaire** aussi (106,9 pour 100 000), le taux est inférieur à ceux de la Somme, de la Picardie et de la France métropolitaine.

Ce sont 32 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005 (20 hommes et 12 femmes).

La prise en charge en affection de longue durée pour l'**hypertension artérielle** (HTA) sévère (151,5 pour 100 000) est quant à elle plus faible qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (respectivement 164,4 et 170,2) mais plus importante que dans la Somme (132,0).

Annuellement, en 2004-2005, les nouveaux admis en ALD pour HTA sévère sont 45 dans l'aire, dont 28 femmes et 17 hommes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Un taux d'admissions en ALD élevé et une mortalité forte pour le cancer du sein

L'aire d'Abbeville a une proportion de 537,7 nouveaux bénéficiaires d'ALD pour **tumeurs malignes** en 2004-2005 pour 100 000 habitants (soit 159 personnes annuelles), ce qui est plus élevé que dans la Somme (489,7), la Picardie (497,8) et la France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 666 séjours hospitaliers par an sont liés à des tumeurs malignes pour des habitants de l'aire, soit un taux de 22,0 ‰ (22,3 ‰ dans la Somme et 24,3 ‰ en Picardie).


Ceci se retrouve pour la mortalité avec un taux de 318,4 pour 100 000 habitants en 2000-2004 dans l'aire, soit 95 décès par an (contre 288,0 dans le département, 286,6 en région et 257,8 au national).



Le **cancer de la prostate** dans l'aire d'Abbeville a un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD de 211,0 pour 100 000, ce qui est plus élevé que dans les autres entités géographiques de référence : 187,0 dans la Somme, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. Ceci est particulièrement visible après 65 ans avec un taux de 1 082,4 contre 828,8 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national. Au total, ce sont 24 nouveaux admis annuellement en 2004-2005, dont 20 ont 65 ans et plus.

Par ailleurs, le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 3,0 ‰ en 2005 (38 séjours), contre 3,6 ‰ dans la Somme et 3,9 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate (5 décès annuels) est par contre moins forte dans l'aire d'Abbeville (49,5 pour 100 000) que dans la Somme (52,8), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1).




En 2004-2005, 33 femmes (dont 22 de moins de 65 ans) de l'aire d'Abbeville ont bénéficié annuellement pour la première fois d'une prise en charge ALD au titre d'un **cancer de sein**.

Proportionnellement, l'aire présente un taux de bénéficiaires supérieur aux autres entités géographiques (208,1 pour 100 000 contre 177,3 dans la Somme, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est de 4,1 ‰ pour les habitantes de l'aire (soit 67 femmes par an entre 2004 et 2005), ce qui situe l'aire entre les taux départemental (3,6 ‰) et régional (4,4 ‰).

De même, lorsqu'on s'intéresse à la mortalité, la tendance est similaire. Ainsi, le taux de mortalité de 49,2 pour 100 000 est plus élevée qu'ailleurs : 39,0 dans la Somme, 37,3 en Picardie et 33,2 en France métropolitaine.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En termes d'admissions en ALD, le **cancer colorectal** représente 12 nouveaux bénéficiaires par an entre 2004 et 2005 dans l'aire d'Abbeville, répartis équitablement entre hommes et femmes. La proportion des nouveaux bénéficiaires dans la population est de 39,1 pour 100 000, ce qui est inférieur aux autres entités géographiques (46,0 dans la Somme, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine).

Le taux de séjours pour cancer colorectal est également légèrement inférieur aux taux départemental et régional : 1,5 ‰ dans l'aire d'Abbeville (soit 44 séjours annuels entre 2004 et 2005, dont 26 hommes et 18 femmes) contre 2,1 ‰ dans la Somme et 2,3 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer colorectal est par contre plus importante dans l'aire (32,9 pour 100 000 en 2000-2004, soit 10 décès par an) que dans la Somme (30,8), la Picardie (28,9) et la France métropolitaine (27,8). Avec le cancer du sein, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par tumeur maligne chez les femmes (4 décès annuels entre 2000 et 2004) avec un taux de 21,2 pour 100 000 femmes.

Pour les **cancers des voies aérodigestives supérieures** (VADS), on dénombre 49 séjours hospitaliers par an en 2004-2005 (dont 44 concernant des hommes) dans l'aire. Ceci représente un taux de séjours de 1,6 ‰ (1,4 ‰ dans la Somme et 1,5 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité (30,1 pour 100 000) plus fort que dans les autres entités géographiques pour cette pathologie (23,6 dans la Somme, 22,2 en Picardie et 17,3 en France métropolitaine). En 2000-2004, il s'agit de 9 décès par an liés à cette pathologie.

Les séjours hospitaliers en 2004-2005 par **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** concernent 59 habitants de l'aire par an, dont 48 hommes, soit un taux de 2,0 ‰ (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité dans l'aire d'Abbeville (62,0 pour 100 000, soit 19 décès par an entre 2000 et 2004) devance toutes les autres entités géographiques (49,9 dans la Somme, 50,0 en Picardie et 44,0 en France métropolitaine).

→ Asthme

En 2006, 2 361 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (1 288 femmes et 1 073 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,9 % des assurés** de l'aire d'Abbeville. Ce taux est plus faible que ceux de la Somme (11,1 %) et de la Picardie (10,3 %). Les femmes et les hommes ont des taux équivalents (9,9 % et 10,0 %).

Les 0-12 ans sont 9,8 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire d'Abbeville (8,2 % des filles et 11,4 % des garçons), soit 412 jeunes en 2006. Ce taux est également inférieur aux taux départemental (12,3 %) et régional (12,0 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un taux de séjours hospitaliers élevé pour troubles mentaux et comportementaux



Le taux d'ALD pour **affection psychiatrique de longue durée** pour des habitants de l'aire d'Abbeville (125,0 pour 100 000 personnes, soit 36 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005) est inférieur à ceux de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8), mais devance celui de la Somme (100,2).

En 2004-2005, 376 séjours hospitaliers par an pour troubles mentaux et comportementaux d'habitants de l'aire ont été dénombrés, soit un taux de 12,3 ‰ (5,3 ‰ dans la Somme et 7,5 ‰ en Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (28 nouvelles admissions annuelles en 2004-2005, dont 20 femmes), l'aire d'Abbeville a un taux plus fort (94,5) que ceux du département (87,8), de la région (89,5) et du niveau national (86,2).

En 2006, 2,2 % des personnes de 70 ans et plus du régime général ont eu une prescription de **médicaments anti-Alzheimer** dans l'aire d'Abbeville, contre 2,8 % dans la Somme et la Picardie.

Les femmes ont des taux plus élevés que les hommes : 2,7 % des femmes de 70 ans et plus du régime général contre 1,4 % des hommes de l'aire (respectivement 3,0 % et 2,3 % dans la Somme et 3,2 % et 2,1 % en Picardie).



En 2006, 26,8 % des assurés sociaux ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (31,5 % des femmes et 20,7 % des hommes). Cette proportion est plus élevée que celles de la Somme (26,3 %) et de la Picardie (24,1 %). Elle correspond à 6 088 personnes.

Les **anxiolytiques** sont la classe la plus remboursée : la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006 est de 19,3 % (23,4 % des femmes et 14,3 % des hommes). Cette proportion est plus importante dans l'aire que dans la Somme (18,1 %) et la Picardie (16,4 %).

Au total, 4 411 personnes sont remboursées pour un anxiolytique en 2006.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 8,6 % des assurés de l'aire, contre 8,8 % pour la Somme et 8,3 % pour la Picardie (10,9 % des femmes et 5,7 % des hommes, soit 1 973 personnes).

Pour les **neuroleptiques**, la proportion des personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,6 % (364 personnes), tout proche des moyennes départementale et régionale (1,7 % et 1,6 %).

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de traitement de la **dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,1 % (27 personnes), 0,1 % (31 personnes) et 0,6 % (136 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).

→ Prévention


Des taux élevés de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus

Durant la campagne de **dépistage organisé du cancer du sein** de 2005-2006, 2 369 mammographies ont été effectuées dans l'aire d'Abbeville, soit une participation de 55,2 % des femmes de 50-74 ans de l'aire.

Cette participation est assez forte au regard des chiffres enregistrés dans la Somme (52,7 %), en Picardie (45,5 %) et en France entière (47,1 %).

En 2006, 1 533 **frottis** ont été effectués sur des femmes de 25-64 ans de l'aire d'Abbeville.

Ceci représente un pourcentage de 23,0 %, ce qui est au-dessus du département (20,1 %) et de la région (20,8 %).




Proportion de femmes de 50-74 ans dépistées en 2005-2006 dans le cadre de la campagne de dépistage organisé du cancer du sein (en %)

Sources : Aisne Préventis, Adcaso, Adema 80, Insee, OR2S
Le chiffre pour la France entière est issu des données de l'InVs. À titre indicatif, selon cette même source, la Picardie a un taux de 44,9 %.

Dans l'aire d'Abbeville, 8,6 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** en 2000-2003. Ce pourcentage est plus faible que dans la Somme (13,5 %) et la Picardie (15,7 %).

Le pourcentage de **prématurés** en 2000-2003 est également plus faible dans l'aire d'Abbeville (4,7 %) que dans la Somme (5,4 %) et la Picardie (5,6 %).



Pourcentage de personnes de 65 ans et plus prises en charge dans le régime général vaccinées contre la grippe en 2006

Sources : Urcam - Régime général, Erasme Régional

En 2006, 61,4 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire d'Abbeville sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est moins élevé que dans le département (66,2 %) et qu'en région (64,9 %).

Les femmes sont moins vaccinées que les hommes : 59,1 % des femmes de 65 ans et plus, contre 65,9 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 42,3 % à être vaccinées dans l'aire, avec cette fois-ci une proportion plus importante chez les femmes : 44,9 % des femmes contre 40,2 % des hommes en ALD.

Les personnes en ALD de l'aire sont moins vaccinées que celles de la Somme (50,8 %) et de la Picardie (46,7 %).

En 2006, 83,3 % des enfants de deux ans ont été vaccinés contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit moins que la Somme (85,0 %) et la Picardie (89,2 %).

Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 88,5 % des enfants de deux ans, ce qui est plus que la Somme (77,4 %) et la Picardie (84,6 %).


Le taux de vaccination passe à 87,7 % pour la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est inférieur à ceux de la Somme (89,5 %) et de la Picardie (91,3 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est moins pratiquée dans l'aire : 48,5 % des enfants de deux ans en 2006, contre 49,6 % dans la Somme et 52,7 % en Picardie.

Les enfants de douze ans de l'aire d'Abbeville sont 40,9 % à avoir **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ou un stomatologue** en 2005-2006. Cette proportion est plus élevée que dans la Somme (38,8 %) et la Picardie (36,9 %).

Ils sont 31,0 % à avoir subi une intervention (30,2 % dans le département et 27,4 % en région) : 69 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle métallique, scellement prophylactique), 47 des actes de chirurgie et 83 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S


L'aire d'Abbeville présente une population avec un revenu moyen inférieur à celui trouvé en Picardie et un taux de chômage de longue durée comparable à celui de la région.

Les bénéficiaires du RMI (rapport de 1,6) et la densité de logements sociaux (rapport de 1,4) sont supérieurs à la moyenne picarde.

L'aire comptant davantage de personnes âgées que la Picardie, le taux de bénéficiaires de l'aide ménagère, ainsi que le taux d'APA à domicile, y sont supérieurs (rapports de 2,3 et 1,2).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

La mortalité liée à l'appareil cardiovasculaire dans l'aire d'Abbeville est équivalente à la moyenne picarde, et légèrement supérieure à la moyenne nationale.

Concernant les ALD pour cette pathologie, l'aire est en dessous des deux entités.

Les ALD et la mortalité pour tumeurs malignes sont plus élevés que les niveaux picard et national.

L'ensemble des ALD est légèrement moins élevé que la moyenne régionale et équivalente à la moyenne nationale, tandis que la mortalité générale est plus forte dans l'aire.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de dépistage du cancer du sein, ainsi que le pourcentage de frottis réalisés sont plus élevés dans l'aire qu'en région (rapports de 1,2 et 1,1).

De même, les consultations de dentistes des enfants de douze ans (1,1), ainsi que les soins dentaires (1,1) réalisés sont plus importants dans l'aire qu'en Picardie.

En revanche, les vaccinations ROR et anti-grippale chez les 65 ans et plus sont moins bien suivies dans l'aire d'Abbeville qu'en Picardie (rapports de 0,9 pour chaque).



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'une des spécificités de l'aire d'Abbeville est l'écart important concernant l'espérance de vie à la naissance avec le niveau national.

En effet, comparativement à la France métropolitaine, des écarts très importants se marquent : les hommes d'Abbeville ont 4 ans de moins de vie en moyenne et les femmes ont un écart, moins grand que les hommes mais tout de même important de 2,4 ans.

De plus, l'aire d'Abbeville connaît une mortalité générale plus importante que partout ailleurs : 1 114,9 pour 100 000 habitants contre respectivement 1 052,7 et 911,3 en Picardie et en France métropolitaine.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, on compte annuellement 543 bénéficiaires de l'ALD (affection de longue durée), soit 1 836,4 bénéficiaires pour 100 000 habitants de l'aire. Cette proportion est inférieure à celles observées dans la Somme (1 855,0), en Picardie (1 946,5) et en France métropolitaine (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 71,9 ans pour les hommes de l'aire et 80,8 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire d'Abbeville connaît une mortalité générale (1 114,9 pour 100 000 habitants) plus forte qu'en Picardie (1 052,7) et surtout qu'en France métropolitaine (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire ont une mortalité plus faible dans l'aire (308,7 pour 100 000) qu'en Picardie (314,2) mais plus forte qu'en France métropolitaine (271,8).

Plus précisément, la mortalité par maladies vasculaires cérébrales (60,3 contre 69,6 en Picardie et 63,4 en France métropolitaine) et les taux de bénéficiaires de l'ALD au titre d'une pathologie cardiaque grave (139,6 pour 100 000 en 2004-2005 contre respectivement 149,7 et 140,1), d'une maladie coronaire (106,9 contre 150,0 et 140,8) et d'une hypertension artérielle sévère (151,5 contre 164,4 et 170,2) sont moins élevés dans l'aire qu'en région et qu'au niveau national.

Cancers

Les tumeurs malignes provoquent une mortalité plus importante dans l'aire (318,4 pour 100 000) que dans la région (286,6) et qu'au niveau national (257,8).

Le cancer de la prostate a un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD de 211,0 pour 100 000 contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité dans l'aire est de 49,5 pour 100 000 contre 53,8 en Picardie et 45,1 en France métropolitaine.

Le cancer colorectal présente un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD plus faible que la Picardie et la France métropolitaine (39,1 pour 100 000 contre 46,8 et 48,4) mais une mortalité plus forte (32,9 contre 28,9 et 27,8).

Par contre, le cancer du sein a un taux d'ALD plus élevé (208,1 contre 172,6 et 175,3) et une mortalité également plus forte (49,2 contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire d'Abbeville se caractérise par un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences plus fort que dans la région picarde et même qu'au niveau national (94,5 pour 100 000 habitants, contre respectivement 89,5 et 86,2).

Les assurés du régime général de l'aire d'Abbeville sont plus nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour psychotropes que dans la région (26,8 % contre 24,1 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage du cancer du sein (55,2 %) et le pourcentage de frottis (23,0 %) sont plus importants dans l'aire d'Abbeville qu'en Picardie (45,5 % et 20,8 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus faible dans l'aire (8,6 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippe chez les 65 ans et plus et chez les personnes en ALD sont moins nombreuses dans l'aire qu'en région. Les vaccinations infantiles sont soit moins bien suivies (ROR, DTP, hépatite B), soit au dessus de la moyenne régionale (BCG).

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire d'Abbeville ont davantage consulté un dentiste, et ont donc davantage de soins dentaires, que les enfants picards.

12

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en janvier 2009
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).