

Regard santé

l'aire de Maignelay-Montigny

→ Présentation de l'aire

L'aire de Maignelay-Montigny comprend **un seul canton** éponyme. Au recensement de 2006, on compte 8 581 habitants, soit une densité de 55,3 habitants au km². Cette densité est plus faible que celles observées dans l'Oise (135,3 h/km²), en Picardie (97,6 h/km²) et en France métropolitaine (112,9 h/km²).

La population de l'aire de Maignelay-Montigny est relativement jeune avec une part des **moins de 25 ans** (35,5 %) supérieure aux indicateurs départemental (34,0 %), régional (33,1 %) et national (30,9 %).


Les personnes âgées de **25 à 59 ans** représentent 46,0 % de cette population en 1999, soit une proportion inférieure à celles de l'Oise (49,4 %), de la Picardie (47,8 %) et de la France métropolitaine (47,8 %). Les **75 ans et plus** comptent pour 6,7 % de la population de l'aire, ce qui est proche du pourcentage picard (6,6 %) et situé entre ceux du département (5,5 %) et du niveau national (7,7 %).

En 2003-2006, l'aire de Maignelay-Montigny présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 2,06 enfants par femme, proche de celui du département (2,07) et supérieur aux indices régional et national (respectivement 2,00 et 1,90).

On enregistre sur cette période 411 naissances domiciliées (dont les parents résident dans l'aire). Parmi elles, 4 sont le fait de **mères mineures**, soit un taux de 9,7 pour 1 000 naissances vivantes. Ce taux est supérieur aux taux isarien (7,6 ‰), picard (9,6 ‰) et métropolitain (5,6 ‰).

Entre 2001 et 2004, sur les 428 naissances domiciliées dans l'aire, 42,1 % ont eu lieu à Compiègne, 21,5 % à Montdidier, 13,6 % à Clermont et 12,4 % à Amiens.

On dénombre sur la même période 601 décès d'habitants de l'aire. Ils sont survenus à Montdidier pour 40,1 % d'entre eux, à Compiègne pour 23,0 %, à Boves pour 11,0 % et à Amiens pour 10,1 %.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie

Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Relativement moins d'allocataires d'aides sociales que dans les entités de référence

En 2005, la part de foyers **non imposables** (51,0 %) est plus importante dans l'aire de Maignelay-Montigny que dans l'Oise (42,5 %), qu'en Picardie (47,8 %) et qu'en France métropolitaine (46,2 %).

Le **revenu moyen** imposable des habitants est de 14 258 €, ce qui est plus faible que ceux des Isariens (17 447 €), des Picards (15 938 €) et des Français (17 165 €).

En 2004, le taux de bénéficiaires de l'**aide ménagère** dans l'aire de Maignelay-Montigny est de 11,7 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus, soit un taux en dessous des taux isarien (20,7 ‰) et picard (21,3 ‰).

Le taux de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile en 2005 s'inscrit entre ceux du département et de la région (100,2 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus dans l'aire contre 72,7 ‰ dans l'Oise et 117,7 ‰ en Picardie) et sous le taux national (149,4 ‰).

En 2004, on dénombre 369 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1 dans l'aire de Maignelay-Montigny.


Parmi eux, les moins de 25 ans de l'aire sont relativement plus nombreux (26,6 %) que dans l'Oise (23,5 %) et qu'en Picardie (24,8 %). À l'opposé, la part des 50 ans et plus (13,3 %) est inférieure à celle observée dans le département (14,3 %) et proche de celle de la région (13,6 %).

Les chômeurs de longue durée (DEFM depuis 1 an et plus) sont également moins représentés dans l'aire (30,4 %) qu'au niveau régional (33,9 %) mais autant qu'au niveau départemental (30,6 %).

L'aire compte moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI) que dans les autres entités géographiques de référence : 27,8 allocataires pour 1 000 ménages en 2004, contre 36,8 ‰ dans l'Oise, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine.


Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 102,9 pour 1 000 familles monoparentales et 7,8 pour 1 000 couples) que dans l'Oise (116,9 ‰ et 11,2 ‰) et qu'en Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

En 2004, l'aire de Maignelay-Montigny compte 20,0 Rmistes de 25-49 ans pour 1 000 personnes du même âge, ce qui est moins élevé que dans le département (26,6 ‰) et la région (33,4 ‰).



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

2



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

En 2005, l'aire compte 72 bénéficiaires de la **CMU de base**, soit un taux de 8,4 bénéficiaires pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux constatés dans l'Oise (13,6 ‰), en Picardie (16,1 ‰) et en France métropolitaine (22,1 ‰).

Les bénéficiaires de la **CMU complémentaire** sont 450 dans l'aire de Maignelay-Montigny, soit un taux de 52,4 pour 1 000 habitants plus faible que les taux de l'Oise (70,7 ‰), de la Picardie (89,6 ‰) et de la France métropolitaine (67,5 ‰).

→ Professionnels de santé


De faibles densités et des professionnels de santé plus âgés qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine

En novembre 2006, l'aire de Maignelay-Montigny compte 5 **médecins généralistes** (tous des hommes), soit une densité de 5,8 médecins pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Oise (8,6), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Leur âge moyen est de 55,0 ans, ce qui est supérieur aux âges moyens isarien (49,6 ans), picard (49,4 ans) et français (49,8 ans).

Par ailleurs, les médecins généralistes de 55 ans et plus sont plus nombreux dans l'aire (40,0 %) que dans les autres entités géographiques de référence (31,6 % dans l'Oise, 31,5 % en Picardie et 32,3 % en France métropolitaine).

L'aire ne compte aucun **spécialiste** en novembre 2006. Les villes de Compiègne, Clermont et Montdidier captent les installations de spécialistes et la proximité de l'aire avec ces villes permet aux habitants d'avoir recours aux spécialistes.



Sources : Adeli, Insee, OR2S

En avril 2007, 2 **chirurgiens dentistes** (uniquement des hommes) sont installés dans l'aire de Maignelay-Montigny, soit une densité de 2,3 chirurgiens dentistes pour 10 000 habitants. Cette densité est inférieure à celles de l'Oise, de la Picardie (4,0 chacun) et de la France métropolitaine (6,2).

L'âge moyen de ces chirurgiens dentistes est de 57,0 ans, ce qui est supérieur aux moyennes du département (48,4 ans), de la région (48,2 ans) et du niveau national (47,8 ans). Les deux chirurgiens dentistes de l'aire ont 55 ans ou plus.


Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes) sont au nombre de 9 (dont 7 femmes) dans l'aire, ce qui représente une densité de 10,4 auxiliaires pour 10 000 habitants au 30 avril 2007. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (11,8), de la Picardie (13,8) et de la France métropolitaine (21,9).

L'âge moyen de ces auxiliaires est de 48,9 ans, soit plus de 5 ans supérieur aux indicateurs isarien (43,5 ans), picard (43,4 ans) et français (43,6 ans). Deux des neuf auxiliaires médicaux de l'aire ont 55 ans ou plus.

On compte 6 **infirmiers** exerçant dans l'aire de Maignelay-Montigny dont 5 sont des femmes. La densité d'infirmiers libéraux est proche de celle de la région (6,9 pour 10 000 habitants dans l'aire contre 7,1 en Picardie), supérieure à celle du département (5,5) mais reste inférieure à celle de la France métropolitaine (11,2).

Leur moyenne d'âge (44,5 ans) est proche de ceux des zones géographiques de référence : 44,1 ans dans l'Oise, 44,6 ans en Picardie et 44,9 ans en France métropolitaine.

Les **pharmacies** de l'aire sont au nombre de 2, soit une densité de 2,4 pharmacies pour 10 000 habitants inférieure à celles observées dans le département (3,1) et la région (3,3).



Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, les habitants de l'aire de Maignelay-Montigny ont consulté un médecin généraliste de l'aire dans 40,1 % des cas. Par ailleurs, 26,7 % des consultations ont eu lieu à Compiègne, 9,3 % à Clermont et 7,9 % à Beauvais.


En revanche, concernant les autres professionnels de santé, l'aire étant dépourvue de spécialistes, les habitants se tournent principalement vers Compiègne, Montdidier, Clermont et Beauvais.

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Maignelay-Montigny est de 73,7 ans pour les hommes et de 80,8 ans pour les femmes. Ces indicateurs sont inférieurs à ceux de l'Oise (74,8 ans et 82,0 ans) et de la Picardie (74,1 ans et 81,7 ans).

Hommes et femmes de l'aire ont des espérances de vie inférieures de respectivement 2,2 ans et 2,4 ans aux moyennes nationales (75,9 ans et 83,2 ans).



Entre 2000 et 2004, l'aire de Maignelay-Montigny connaît une **mortalité générale** de 1 151,2 décès pour 100 000 habitants, soit une moyenne de 84 décès par an. Cette mortalité est plus forte que dans l'Oise (1 014,9), qu'en Picardie (1 052,7) et qu'en France métropolitaine (911,3).

La **mortalité prématurée** (décès survenant avant 65 ans) est également supérieure dans l'aire : 295,6 décès pour 100 000 habitants (soit 18 décès en moyenne par an) contre 243,2 dans l'Oise, 262,7 en Picardie et 221,5 en France métropolitaine.

Plus de la moitié des décès survenant dans l'aire de Maignelay-Montigny entre 2000 et 2004 est le fait de **tumeurs** et de maladies de l'**appareil circulatoire** (65,4 % des décès masculins et 50,8 % des décès féminins).

Les hommes de l'aire de Maignelay-Montigny sont davantage touchés par les **tumeurs** (38,0 % des décès) puis par les maladies de l'appareil circulatoire (27,3 %).

Cet ordre est inversé chez les femmes où les maladies de l'**appareil circulatoire** sont la première cause de mortalité (31,4 % des décès) devant les tumeurs (19,4 %). Au troisième rang des causes de mortalité, on trouve chez les hommes les **causes externes** de mortalité (8,2 % des décès) et chez les femmes, les maladies de l'appareil respiratoire (11,2 %).

L'aire de Maignelay-Montigny affiche un taux de mortalité par **suicide** de 15,9 décès pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux isarien (20,6), picard (23,1) et national (18,0).

Le taux de mortalité par **accident de la circulation** de l'aire (16,8 décès pour 100 000 habitants) est plus élevé que ceux de l'Oise (14,7), de la Picardie (14,3) et de la France métropolitaine (10,8).

En 2004-2005, 2 285 **séjours hospitaliers** par an ont été enregistrés pour des habitants de l'aire, soit un taux de 285,3 séjours pour 1 000 habitants. Ce taux est proche du taux picard (289,3 ‰) et inférieur au taux isarien (299,9 ‰).

Concernant les **nouvelles admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales pathologies en cause pour les hommes (37,0 %) comme pour les femmes (44,4 %).

Le **diabète** fait partie des pathologies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux d'admissions en ALD dans l'aire de Maignelay-Montigny est de 279,2 pour 100 000 habitants en 2004-2005, ce qui est inférieur aux taux du département et de la région (308,2 et 311,4) mais supérieur au taux national (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	17	26,2	1	18	24,7	1
Diabète	12	18,3	2	9	12,3	2
Maladie coronaire	6	8,7	3	4	5,5	7
Pathologies cardiaques graves	5	7,1	4	6	8,2	4
Affections psychiatriques de longue durée	5	7,1	5	8	10,3	3
Hypertension artérielle sévère	4	7,1	6	4	6,2	6
Maladie d'Alzheimer et autres démences	4	5,6	7	3	3,4	10
Artériopathies chroniques graves	3	4,0	8	4	6,2	5
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives	2	2,4	9	1	0,7	21
Maladie de Parkinson	1	1,6	10	2	2,1	12
Accident vasculaire cérébral	1	0,8	13	4	4,8	8
Insuffisance respiratoire chronique grave	1	0,8	16	4	4,8	9
Autres causes de nouvelles admissions	7	10,3	-	8	11,0	-
Total	63	100		73	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Une mortalité cardiovasculaire plus élevée dans l'aire mais des taux d'admissions en ALD moindres

Les **maladies de l'appareil circulatoire** comprennent l'hypertension artérielle sévère (HTA), les pathologies cardiaques graves, les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l'artériopathie chronique. Les maladies de l'appareil circulatoire ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 41 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) se répartissant en 23 admissions pour les hommes et 18 admissions pour les femmes. Ces admissions représentent un taux de 559,0 pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (638,7), de la Picardie (602,0) et de la France métropolitaine (586,1).

Le taux de séjours hospitaliers pour ces pathologies est de 27,5 pour 1 000 habitants de l'aire en 2004-2005, soit 204 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an. Ce taux est proche de ceux de l'Oise (27,3 ‰) et de la Picardie (27,8 ‰).

Le taux de mortalité pour les maladies de l'appareil circulatoire est supérieur dans l'aire (349,6 décès pour 100 000 habitants) à ceux du département (297,8), de la région (314,2) et de la métropole (271,8).


En 2004-2005, le taux de séjours hospitaliers pour **cardiopathie ischémique** dans l'aire (5,6 pour 1 000 habitants) est proche de ceux de l'Oise (6,0 ‰) et de la Picardie (6,1 ‰). Ceci représente 41 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an (23 hommes et 18 femmes).

Le taux de mortalité pour cette pathologie est supérieur dans l'aire de Maignelay-Montigny (127,9 décès pour 100 000 habitants) aux taux isarien (82,5), picard (86,6) et français (74,6).

Le taux d'admissions en ALD pour **accident vasculaire cérébral** (AVC) est plus faible dans l'aire que dans les entités géographiques de référence : 54,7 pour 100 000 (soit 4 admissions en moyenne par an) contre 57,4 dans l'Oise, 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers en 2004-2005 (2,8 pour 1 000) est proche de ceux du département (3,3 ‰) et de la région (2,8 ‰) et représente 21 séjours par an pour des habitants de l'aire (11 hommes et 10 femmes).

Le taux de mortalité pour AVC dans l'aire est de nouveau supérieur à ceux des autres entités de référence : 88,9 décès pour 100 000 habitants contre 67,5 dans l'Oise, 69,6 en Picardie et 63,4 en France métropolitaine.



Le taux d'admissions en ALD pour **pathologies cardiaques graves** est proche du niveau régional (148,6 pour 100 000 habitants dans l'aire contre 149,7 en région), plus faible que le taux du département (153,1) et plus élevé que celui du niveau national (140,1).

En 2004-2005, 11 admissions par an pour cette pathologie dans l'aire ont été recensées (5 femmes et 6 hommes).

Le taux d'admissions en ALD pour **maladie coronaire** dans l'aire est en dessous des entités géographiques de référence : 133,4 pour 100 000 contre 147,1 dans l'Oise, 150,0 en Picardie et 140,8 en France métropolitaine.

Le nombre de nouvelles admissions en ALD pour maladie coronaire est en moyenne de 10 par an dans l'aire (6 femmes et 4 hommes).

Le taux d'admissions en ALD pour **hypertension artérielle sévère** dans l'aire de Maignelay-Montigny (127,4 admissions pour 100 000 habitants) est inférieur à ceux de l'Oise (203,9), de la Picardie (164,4) et de la France métropolitaine (170,2).

On compte 8 admissions en ALD par an en HTA dans l'aire, repartis équitablement entre hommes et femmes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

À l'exception des cancers du sein et des voies aérodigestives supérieures, une mortalité élevée

Le taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** dans l'aire de Maignelay-Montigny est de 466,5 pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (482,4), de la Picardie (497,8) et de la France métropolitaine (483,1). Les tumeurs représentent 35 nouvelles admissions annuelles en ALD sur la période 2004-2005 (17 femmes et 18 hommes).

En 2004-2005, 207 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire ont été enregistrés pour l'ensemble des tumeurs (122 hommes et 85 femmes), soit un taux de 26,4 séjours pour 1 000 habitants proche de celui du département (26,9 ‰) et supérieur à celui de la région (24,3 ‰).

Le taux de mortalité pour l'ensemble des tumeurs dans l'aire (322,8 décès pour 100 000 habitants) est supérieur à ceux de l'Oise (278,7), de la Picardie (286,6) et de la France métropolitaine (257,8).




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

Le taux d'admissions en ALD des hommes de l'aire de Maignelay-Montigny pour **cancer de la prostate** (180,4 pour 100 000 habitants) est plus faible que ceux de l'Oise (203,9), de la Picardie (209,5) et de la France métropolitaine (198,0). Entre 2004 et 2005, on compte 5 admissions en ALD par an pour cancer de la prostate dans l'aire, dont 4 pour des hommes de 65 ans et plus. Après 65 ans, le taux d'admissions en ALD est également plus faible dans l'aire : 851,8 pour 100 000 contre 963,1 dans le département, 969,5 dans la région et 915,3 dans le pays.

Le taux de séjours hospitaliers pour ce cancer est proche des indicateurs du département et de la région : 4,1 pour 1 000 contre 3,9 ‰ pour l'Oise et la Picardie. Ceci représente 14 séjours hospitaliers par an dans l'aire en 2004-2005.

Le taux de mortalité est supérieur aux entités géographiques de référence : 66,2 décès pour 100 000 habitants contre 50,2 dans l'Oise, 53,8 en Picardie et 45,1 en France métropolitaine.




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

Le taux d'admissions des femmes de l'aire en ALD pour **cancer du sein** (233,0 pour 100 000) est le plus élevé des aires picardes et se place au-dessus des taux de l'Oise (169,8), de la Picardie (172,6) et de la France métropolitaine (175,3). Cela représente 9 femmes admises en ALD en moyenne par an dont 6 de moins de 65 ans.

En 2004-2005, 15 hospitalisations ayant comme diagnostic un cancer du sein ont été enregistrées par an pour des habitantes de l'aire. Cela représente un taux de 3,7 pour 1 000 habitantes, ce qui est inférieur à ceux de l'Oise (4,9 ‰) et de la Picardie (4,4 ‰).

Le taux de mortalité pour ce cancer est de 28,3 décès pour 100 000 femmes, ce qui est plus faible que les taux départemental (36,6), régional (37,3) et métropolitain (33,2).

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En 2004-2005, le taux d'admissions en ALD pour le **cancer du côlon-rectum** est de 87,4 pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à ceux de l'Oise (45,8), de la Picardie (46,8) et de la France métropolitaine (48,4). Cela représente 7 admissions en moyenne par an dans l'aire (5 hommes et 2 femmes).

Le taux de séjours hospitaliers est également plus élevé dans l'aire de Maignelay-Montigny : 3,4 séjours pour 1 000 habitants contre 2,5 ‰ pour le département et 2,3 ‰ pour la région. On dénombre 26 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an pour cette pathologie en 2004-2005 (19 hommes et 7 femmes).

Le taux de mortalité pour ce cancer est supérieur lui aussi aux autres entités de référence (30,5 décès pour 100 000 habitants dans l'aire contre 26,1 dans l'Oise, 28,9 en Picardie et 27,8 en France métropolitaine).

Concernant le **cancer des voies aérodigestives supérieures** (VADS), le taux de séjours hospitaliers pour cette pathologie dans l'aire est proche de ceux du département et de la région : 1,8 pour 1 000 dans l'aire (soit 15 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an, dont 3 hommes) contre 1,5 ‰ dans l'Oise et en Picardie.

Le taux de mortalité pour ce cancer est plus faible dans l'aire (19,6 décès pour 100 000 habitants) que dans l'Oise (20,3) et qu'en Picardie (22,2) mais reste supérieur au taux de la France métropolitaine (17,3).

Le taux de séjours hospitaliers pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** est plus légèrement plus élevé dans l'aire que dans les entités géographiques de référence : 3,5 séjours pour 1 000 habitants dans l'aire contre 3,3 ‰ dans le département et 2,8 ‰ dans la région. Ceci représente 27 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire (18 hommes et 9 femmes).

La mortalité pour ce cancer est plus élevée dans l'aire de Maignelay-Montigny (53,2 décès pour 100 000 habitants) que dans l'Oise (49,0), qu'en Picardie (50,0) et qu'en France métropolitaine (44,0).

7

→ Asthme

En 2006, 577 assurés du régime général ont été **remboursés un traitement contre l'asthme*** (304 femmes et 273 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,1 % des assurés** de l'aire de Maignelay-Montigny. Ce taux est proche de celui de l'Oise (9,5 %) et inférieur à celui de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins sont équivalents dans l'aire : 9,3 % des femmes et 9,2 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 12,4 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Maignelay-Montigny, soit 154 jeunes en 2006. Ce taux est également proche des taux départemental (11,5 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 9,7 % des filles (9,7 % dans l'Oise et 10,1 % en Picardie) contre 15,1 % des garçons (respectivement 13,3 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.


→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Moins de remboursements pour anxiolytiques dans l'aire que dans l'Oise et qu'en Picardie

En 2004-2005, 13 habitants de l'aire de Maignelay-Montigny ont été admis en ALD en moyenne par an pour **affections psychiatriques de longue durée** (8 hommes et 5 femmes), soit un taux d'admissions (154,3 pour 100 000 personnes) qui se situe sous le taux métropolitain (169,8), mais au-dessus des taux départemental et régional (respectivement 139,6 et 131,9).


Inversement, le taux de séjours hospitaliers de l'aire de Maignelay-Montigny pour troubles mentaux et du comportement (5,3 séjours pour 1 000 habitants) est inférieur à ceux de l'Oise et de la Picardie (respectivement 10,4 ‰ et 7,5 ‰).

L'aire de Maignelay-Montigny a enregistré en 2004-2005, 7 nouvelles admissions en ALD pour la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (3 hommes et 4 femmes), soit un taux d'admissions de 88,1 pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (91,7) et de la Picardie (89,5) et supérieur à celui de la France métropolitaine (86,2).



En 2006, 17 personnes du régime général de 70 ans et plus ont été remboursées pour un **traitement anti-Alzheimer** dans l'aire (14 femmes et 3 hommes). Cela représente 2,8 ‰ des 70 ans et plus du régime général de l'aire contre 2,6 ‰ dans l'Oise et 2,8 ‰ en Picardie.

Les femmes sont davantage remboursées pour ces médicaments que les hommes : 3,8 ‰ des femmes de cette tranche d'âge dans l'aire (2,9 ‰ des Isariennes et 3,2 ‰ des Picardes) contre 1,3 ‰ des hommes (2,0 ‰ des Isariens et 2,1 ‰ des Picards).



En 2006, 1 246 assurés de l'aire de Maignelay-Montigny ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope**, soit 22,0 ‰ des assurés (27,2 ‰ des femmes contre 16,4 ‰ des hommes). Ce taux est proche de celui du département (22,1 ‰) et inférieur à celui de la région (24,1 ‰).

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. En 2006, 835 assurés de l'aire de Maignelay-Montigny ont été remboursés pour un anxiolytique, soit 14,4 ‰ des assurés (19,0 ‰ des femmes et 9,4 ‰ des hommes). Ce taux est plus faible que ceux de l'Oise (15,0 ‰) et de la Picardie (16,4 ‰).

Les deuxièmes psychotropes les plus remboursés sont les **anti-dépresseurs**. Ils ont été remboursés en 2006 à 425 personnes de l'aire, soit 7,3 ‰ de l'ensemble des assurés (10,1 ‰ des femmes et 4,4 ‰ des hommes). Ce taux est là encore plus faible que ceux présentés par le département (7,7 ‰) et la région (8,3 ‰).

Cette même année, 94 personnes ont été remboursées pour des **neuroleptiques**, soit un taux de 1,8 ‰ (1,8 ‰ des hommes et 1,7 ‰ des femmes) supérieur à ceux de l'Oise (1,5 ‰) et de la Picardie (1,6 ‰).

La consommation de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernant moins de 1,0 ‰ des assurés de l'aire : respectivement 0,2 ‰ (13 personnes), 0,2 ‰ (16 personnes) et 0,3 ‰ (16 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Un taux élevé de dépistage organisé du cancer du sein

Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** en 2005-2006, 524 mammographies ont été réalisées pour des assurées de l'aire de Maignelay-Montigny.


Le pourcentage de femmes âgées de 50 à 74 ans dépistées est de 52,5 % dans l'aire, ce qui est supérieur aux taux de l'Oise (43,8 %), de la Picardie (45,5 %) et de la France entière (47,1 %).

En 2006, 377 **frottis** ont été effectués par des femmes âgées de 25 à 64 ans dans l'aire de Maignelay-Montigny, soit 21,6 % des femmes de cette tranche d'âge. Cette part est supérieure à celle observée dans la région (20,8 %) mais inférieure à celle du département (24,2 %).



Le pourcentage de femmes ayant accouché entre 2000 et 2003 et ayant bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** est plus élevé dans l'aire (15,9 %) que dans le département (10,7 %) et proche de la région (15,7 %).

Le pourcentage de naissances **prématurées** est en revanche plus faible : 3,7 % dans l'aire contre 5,3 % dans l'Oise et 5,6 % en Picardie.



En 2006, 63,7 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire de Maignelay-Montigny ont été **vaccinées contre la grippe**. Cette part s'inscrit entre celles de l'Oise (62,3 %) et de la Picardie (64,9 %).

Les femmes de l'aire sont moins vaccinées que les hommes (59,4 % des femmes de cette tranche d'âge contre 70,4 % des hommes).

Les personnes en ALD de moins de 65 ans sont 40,2 % à être vaccinées contre la grippe en 2006 dans l'aire de Maignelay-Montigny contre 41,1 % dans l'Oise et 46,7 % en Picardie.

Les femmes sont ici plus nombreuses à se faire vacciner (47,6 % des femmes contre 37,9 % des hommes), une tendance que l'on retrouve aux niveaux départemental et régional.

Dans l'aire de Maignelay-Montigny, 87,4 % des enfants de 2 ans nés en 2004 ont été vaccinés contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole**, ce qui est inférieur aux taux du département (91,3 %) et de la région (89,2 %).

Le vaccin contre la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite** a un taux de couverture vaccinale également de 87,4 %, ce qui est plus faible que ceux de l'Oise (91,7 %) et de la Picardie (91,3 %).


Le taux d'enfants ayant reçu le vaccin du **BCG** est de 90,8 % dans l'aire de Maignelay-Montigny. Il est de 87,4 % dans l'Oise et de 84,6 % en Picardie.

Le vaccin contre l'**hépatite B** dispose d'une moins bonne couverture dans l'aire (44,8 %) qu'aux niveaux départemental (51,5 %) et régional (52,7 %).

Un peu plus d'un quart des enfants de 12 ans (26,1 %) de l'aire de Maignelay-Montigny a **consulté un dentiste, un stomatologue et/ou un chirurgien dentiste** entre le 1^{er} août 2005 et le 31 juillet 2007. Cet indicateur est plus faible que ceux de l'Oise (33,7 %) et de la Picardie (36,9 %).

Un peu plus d'un cinquième (21,7 %) des enfants de 12 ans de l'aire a subi une intervention (4,7 % dans le département et 27,4 % dans la région) dont 16 enfants qui ont bénéficié de soins conservateurs, 4 de soins de chirurgie et 19 de soins d'orthodontie.


→ Graphiques polaires



Les indicateurs sociaux présentés ici sont tous inférieurs dans l'aire par rapport à la Picardie : rapports de 0,9 pour le revenu moyen et le chômage de longue durée, de 0,8 pour l'APA à domicile, de 0,6 pour le taux de Rmistés, de 0,5 pour les bénéficiaires de l'aide ménagère et de 0,3 pour la densité de logements sociaux.

Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.
La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



L'aire de Maignelay-Montigny présente un taux de mortalité générale supérieur à ceux de la Picardie (rapport de 1,1) et de la France métropolitaine (rapport de 1,3). Son taux d'admissions pour l'ensemble des ALD est légèrement plus faible que celui de la Picardie (rapport de 0,9) et équivalent au taux métropolitain.

On retrouve ce rapport mortalité élevée / ALD faible dans des proportions identiques sur des groupes de pathologies particulières comme ici pour les maladies cardiovasculaires et les tumeurs.

Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

L'aire de Maignelay-Montigny présente un taux de dépistage organisé du cancer du sein supérieur à celui de la région (rapport de 1,2). Le pourcentage de frottis réalisés est quant à lui proche de l'indicateur régional.

Les taux de couverture vaccinale pour la grippe chez les 65 ans et plus et le ROR pour les enfants de 2 ans sont eux aussi proches des indicateurs régionaux.

Concernant les consultations et soins dentaires pour les enfants de 12 ans, le rapport n'est pas favorable à l'aire avec relativement moins de consultations (rapport de 0,7) et de soins (rapport de 0,8) qu'en région.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Maignelay-Montigny est plus jeune que les entités géographiques de référence et a un indice conjoncturel de fécondité plus élevé que la région et le niveau métropolitain.

C'est une aire avec des indicateurs sociaux assez contrastés, avec un revenu moyen plus bas que dans l'Oise, qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine mais des taux de Rmistes et de bénéficiaires de la CMU moindres.

Du point de vue sanitaire, sa situation est plus défavorable : espérance de vie plus faible que les références, mortalité générale et prématurée plus élevées et peu de professionnels de santé.

En revanche, le dépistage organisé du cancer du sein possède une bonne couverture dans l'aire de Maignelay-Montigny.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, l'aire de Maignelay-Montigny compte 136 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) par an. Cela représente un taux de 1 842,1 nouvelles admissions pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (1 957,7), de la Picardie (1 946,5) et de la France métropolitaine (1 877,1).

L'espérance de vie à la naissance en 2004-2005 est de 73,7 ans pour les hommes et de 80,8 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Maignelay-Montigny présente un taux de mortalité générale (1 151,2 décès pour 100 000 habitants) plus élevé que ceux de l'Oise (1 014,9), de la Picardie (1 052,7) et de la France métropolitaine (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Dans l'aire de Maignelay-Montigny en 2000-2004, la mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (349,6 décès pour 100 000 habitants) est supérieure à celles du département (297,8), de la région (314,2) et du pays (271,8). À l'inverse, le taux d'admissions en ALD pour ces pathologies est plus bas dans l'aire que dans les entités géographiques de référence (respectivement 559,0 contre 638,7, 602,0 et 586,1)

La mortalité liée aux cardiopathies ischémiques (127,9 décès pour 100 000 habitants) est particulièrement élevée au regard des indicateurs locaux (82,5 dans l'Oise et 86,6 en Picardie) et national (74,6).

Cancers

Les tumeurs provoquent une mortalité plus importante dans l'aire (322,8 décès pour 100 000 habitants) que dans le département (278,7), la région (286,6) et qu'au niveau national (257,8).

Inversement, le taux d'admissions en ALD pour ces tumeurs est inférieur dans l'aire (466,5 admissions pour 100 000 habitants) à ceux de l'Oise (482,4), de la Picardie (497,8) et de la France métropolitaine (483,1).

À l'exception des cancers du sein et des voies aérodigestives supérieures, la mortalité par cancer est relativement plus élevée dans l'aire que dans les entités de référence.

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Concernant les admissions en ALD pour affections psychiatriques de longue durée, l'aire de Maignelay-Montigny présente un taux (154,3) inférieur à l'indicateur national (169,8) mais supérieur à ceux de l'Oise et de la Picardie (respectivement 139,6 et 131,9).

La part des assurés du régime général de l'aire remboursés pour un anxiolytique est plus faible que celles observées dans le département et en région (respectivement 14,4 % dans l'aire contre 15,0 % et 16,4 %).

Prévention

Dépistages : le dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 74 ans est mieux suivi dans l'aire (52,5 % des femmes de cette tranche d'âge) qu'en Picardie (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %). Le pourcentage de frottis réalisés chez les femmes âgées de 25 à 64 ans est lui assez proche de la Picardie mais plus faible que dans l'Oise (21,6 % dans l'aire contre 20,8 % en Picardie et 24,2 % dans l'Oise).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant accouché entre 2000 et 2003 et ayant bénéficié de moins de 7 consultations prénatales est plus élevé dans l'aire (15,9 %) que dans le département (10,7 %) et proche de la région (15,7 %).

Vaccination : à l'exception du BCG, les vaccinations infantiles (ROR, DTCP et hépatite B) disposent de couvertures vaccinales plus faibles dans l'aire. Le taux de vaccination anti-grippale chez les plus de 65 ans est proche des indicateurs du département et de la région.

Actes dentaires : la consultation de dentistes par les enfants de 12 ans de l'aire (26,1 %) est inférieure à celles de l'Oise (33,7 %) et de la Picardie (36,9 %). Les enfants de l'aire ont également reçu moins de soins dentaires.

12

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en janvier 2009
Il a été rédigé et mis en page par Hubert Leroi, Anne Ducamp, Alexandra Fourquier,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).