



PICARDIE


LA RÉGION

ensemble, réinventons la Picardie



Diagnostiques Territoriaux de santé des pays de Picardie

■ Compiégnois

 N°Vert 0 800 02 60 80


APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.picardie.fr



Collection

Diagnostiques Territoriaux de santé des pays de Picardie



- 1 : CC* Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA** de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

* CC : communauté de communes

** CA : communauté d'agglomération

Compiègnais

Contexte

Le pays du Compiègnais compte 114 362 habitants au 1^{er} janvier 2006 pour une superficie de 620 km². Le pays représente 14,4 % de la population départementale et 6,0 % de la population régionale. En sept ans, le pays a gagné 3 681 personnes depuis le recensement de 1999, soit un taux d'accroissement annuel de +0,48 %.

Situé au centre-est du département de l'Oise, le Compiègnais est limitrophe du département de l'Aisne mais n'a de frontière ni avec la région parisienne, ni avec le département de la Somme.

Ce pays compte 48 communes classées en zone rurale parmi les 61 communes qui composent le pays, soit une proportion de communes rurales de 78,7 %.

Le pays du Compiègnais est composé également de onze communes de moins de 5 000 habitants : deux dans la communauté de communes de la Basse Automne (Béthisy-Saint-Pierre et Verberie), trois dans la communauté de communes du Canton d'Attichy (Pierrefonds, Trosly-Breuil et Cuise-la-Motte), une dans la communauté de communes de la Plaine d'Estrées (Estrées-Saint-Denis) et cinq dans le secteur de la communauté d'agglomération de Compiègne (Meux, Jaux, Venette, Choisy-au-Bac et Lacroix-Saint-Ouen). Le secteur de la communauté d'agglomération de Compiègne comprend également une commune de 7 614 habitants (Margny-lès-Compiègne) et une commune de 42 036 habitants (Compiègne).



Claude Gewerc
Président du Conseil régional de Picardie

Cette étude détaillée de l'état sanitaire et social des Picards fait partie d'une série d'analyses qui permettront aux acteurs de la santé, mais aussi et avant tout aux politiques de mieux cerner les spécificités de chacun des Pays qui composent notre Région.

Cette démarche scientifique a plusieurs mérites. Le premier d'entre eux est de prendre en compte la diversité d'une région et de ses territoires, de produire des données à l'échelle du pays et des intercommunalités qui le composent, afin qu'un diagnostic précis et nuancé puisse être établi. La santé, on le sait, dépend d'un si grand nombre de facteurs, que cette approche détaillée est la seule qui vaille.

Une autre grande qualité du présent document est de lier le sanitaire et le social, de mettre en parallèle la situation économique des habitants et leurs problèmes de santé. Nous voyons ici exposé dans le détail un lien qui devient une évidence entre inégalités sociales et inégalités sanitaires.

Cette prolongation des injustices économiques et sociales dans le domaine sanitaire, cette série de discriminations qui ne disent pas leur nom dans l'accès aux soins doit être un des principaux soucis d'une politique de santé publique digne de ce nom. Pour une région comme la Picardie, jalonnée d'espaces ruraux à l'habitat clairsemé, cela passe par la lutte contre la formation de déserts sanitaires.

Le Conseil régional utilise pleinement les moyens d'action dont il dispose dans ce domaine, il va même largement au-delà des compétences qui sont les siennes. Le schéma régional des formations sanitaires et sociales 2007-2013 est une illustration de nos efforts pour rendre encore plus accessibles et plus attractives les formations dans les domaines de la santé et de l'action sociale. Le nombre d'étudiants accueillis dans ces filières est en constante augmentation.

La Région incite également les internes en médecine à s'installer en milieu rural, ce qui est l'arme de lutte par excellence contre la désertification sanitaire. En échange d'une allocation d'étude, ces futurs médecins s'engagent à s'installer là où leur présence sert le plus l'intérêt général, dans nos campagnes. Elle passe également des conventions avec les établissements hospitaliers picards afin d'inciter les internes et les futurs professionnels du paramédical à exercer ensuite dans nos hôpitaux.

À l'écoute des pays de Picardie et de leurs besoins, le Conseil régional cofinance la création de maisons médicales pluridisciplinaires, très appréciées des jeunes médecins, ce qui limite, de plus, leurs frais d'installation. De nombreux projets sont en cours d'étude, ce qui nous permettra de multiplier ce type d'infrastructures.

Par ailleurs, dresser un état sanitaire et social d'un territoire permet aux collectivités, aux associations et aux professionnels de terrain d'orienter les actions à développer en fonction des caractéristiques propres à cette entité géographique. Ces initiatives devraient permettre d'influer sur les comportements à risque de la population, face à leur santé.

La question de l'accès aux soins, de la justice sanitaire comme prolongement indispensable de la justice sociale, même si elle trouve des solutions locales dans lesquelles les régions prennent une part de plus en plus large, relève avant tout d'un choix de société national. Les inégalités dans l'accès aux soins et la prévention sont un problème qui ne trouvera de solution pleine et entière que dans une véritable politique de santé publique.

| | |
|---------|--|
| Page 1 | Éditorial |
| Page 3 | Introduction |
| Page 5 | Analyse de la situation |
| Page 6 | Chapitre 1. Données générales |
| Page 6 | Démographie |
| Page 7 | Social |
| Page 10 | Économie |
| Page 11 | Chapitre 2. État de santé |
| Page 11 | Données générales |
| Page 14 | Tumeurs |
| Page 20 | Maladies de l'appareil circulatoire |
| Page 25 | Pathologies liées à la consommation d'alcool |
| Page 27 | Pathologies liées à la consommation de tabac |
| Page 29 | Affections psychiatriques |
| Page 31 | Causes externes |
| Page 34 | Autres causes |
| Page 34 | Vaccinations |
| Page 35 | Chapitre 3. Offre de soins et de services |
| Page 35 | Professionnels de santé |
| Page 45 | Consommation de soins |
| Page 45 | Établissements de soins |
| Page 46 | Permanence des soins et des urgences |
| Page 48 | Dépistages |
| Page 49 | Aides aux personnes âgées |
| Page 49 | Maisons de retraite |
| Page 50 | Chapitre 4. Structures de prévention |
| Page 51 | Synthèse |
| Page 55 | Annexes |
| Page 56 | Affections de longue durée (ALD) |
| Page 56 | Taux standardisés |
| Page 56 | Test de significativité |
| Page 57 | Le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) |
| Page 57 | Le répertoire Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) |
| Page 57 | Les consommations de psychotropes |
| Page 57 | Les professionnels de santé exerçant en libéral |
| Page 58 | Carte des pays de Picardie |
| Page 58 | Carte des principales routes du Compiégnois |
| Page 58 | Carte des zones limitrophes du Compiégnois |
| Page 59 | Structures de prévention |
| Page 61 | Glossaire |

« L'exercice d'évaluation de l'impact territorial d'une politique publique nécessite la définition préalable des objectifs territoriaux de cette politique. De ce point de vue, il est justifié de distinguer deux grandes catégories de politiques publiques : d'un côté, les politiques territoriales, par nature construites autour d'objectifs territoriaux plus ou moins nombreux, et, de l'autre, les politiques sectorielles, qui, s'adressant à l'ensemble du territoire national, se fixent a priori d'autres objectifs que territoriaux ».

Introduction de la définition des objectifs territoriaux dans le livre de Sandrine Haas et d'Emmanuel Vigneron, *Évaluation et territoires*, Collection travaux n°4, Diact, La Documentation française.

La région est en train de devenir le territoire de prédilection où s'élaborent les politiques publiques, et notamment la politique de santé. La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 l'a clairement exprimé. De même, le processus engagé dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et la création des agences régionales de santé (ARS) avec la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 va dans le sens d'un renforcement de ce niveau géographique dans l'élaboration de la politique de santé.

Toutefois, si l'échelon géographique régional constitue une unité satisfaisante du point de vue national, il ne peut être suffisant pour le décideur local. En effet, les travaux engagés par différentes institutions depuis quelques années, et tout particulièrement par les observatoires régionaux de la santé, montrent que les inégalités territoriales en matière sanitaire et sociale sont bien plus importantes à l'intérieur d'une même région qu'entre les régions.

C'est par le biais de *focus* localisés que l'on peut disposer des connaissances nécessaires à l'élaboration d'une politique régionale adaptée aux difficultés rencontrées par la population. Dans ce contexte, l'observatoire régional de la santé et du social de Picardie (OR2S) s'est engagé depuis plusieurs années à produire des indicateurs à différents niveaux géographiques, venus en complément d'extensions régionales à des enquêtes menées au plan national.

Ce regard croisé permet de porter des diagnostics sur l'état des lieux de la région et de la population picarde.

Ces diagnostics reposent sur des partenariats engagés par l'OR2S depuis plusieurs années avec la quasi totalité des producteurs de données du domaine sanitaire et social (Insee, Inserm, InVS, Assurance maladie, conseils généraux, caisses d'allocations familiales, Atih et divers services de l'État), partenariats qui, au niveau national, se concrétisent à travers la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors). Les données sont alors traitées, analysées et partagées avec les experts locaux avant d'être diffusées plus largement.

Appartenant à la série « *Diagnostics Territoriaux de santé des pays de Picardie* », ce document s'inscrit dans cette dynamique et rejoint l'article 4 du décret 2000-90 du 19 septembre 2000*, même si cela n'était pas mentionné alors. Ainsi, la présentation de plus de deux cents indicateurs permet de connaître les forces et les faiblesses du pays.

Quatre chapitres composent ce document. Le premier chapitre décrit la situation en termes démographique, social et économique. Les deux suivants sont plus étoffés et sont consacrés à la mesure de la santé et à l'offre de soins et de services. Le dernier chapitre recense les associations de prévention et témoigne de la collaboration engagée depuis plusieurs années avec le comité régional d'éducation et de promotion de la santé (Cres) de Picardie puis maintenant avec l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (Ireps).

La présentation n'est pas figée. Si la forme est maintenue entre l'ensemble des numéros, des indicateurs peuvent être intégrés en fonction de leur disponibilité, en faisant ainsi un véritable outil réactif d'indicateurs sanitaires et sociaux**.

En conclusion, ce document n'a d'intérêt que s'il est partagé par celles et ceux (professionnels ou population) qui vivent au quotidien les constats portés sur le territoire et par celles et ceux qui peuvent influencer sur leur devenir. Ces situations ne sont pas immuables, à tous de les utiliser pour que, dans notre région, demain soit mieux qu'aujourd'hui.

D^r Joseph Casile
Président de l'OR2S

* Cet article précise que la charte de pays exprime le projet de développement durable du territoire. Elle comprend :

- un rapport établissant un diagnostic de l'état du pays, présentant ses évolutions démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur vingt ans ;
- un document définissant, au moins à dix ans, les orientations stratégiques du pays, les mesures et les modalités d'organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en œuvre ainsi que les dispositions permettant d'évaluer les résultats de l'action conduite au sein du pays ;
- des documents cartographiques, traductions spatiales du diagnostic et du document d'orientation.

Source : *Les pays, collection Territoires en mouvement*, Datar, La Documentation française.

** Les indicateurs seront actualisés en fonction de leur production sur le site internet de l'OR2S.


Précision : Le pays du Compiégnois est composé de quatre établissements publics de coopération intercommunale : trois communautés de communes et une communauté d'agglomération. Ces trois communautés de communes présentent le plus souvent des similitudes pour les données présentées dans ce diagnostic et sont assez différentes de la communauté d'agglomération de Compiègne. C'est la raison pour laquelle sous les tableaux présentant les divers indicateurs est mentionnée la valeur pour les trois communautés de communes regroupées.

Analyse de la situation

| | |
|---------|---|
| Page 6 | Chapitre 1. Données générales |
| Page 11 | Chapitre 2. État de santé |
| Page 35 | Chapitre 3. Offre de soins et de services |
| Page 50 | Chapitre 4. Structures de prévention |

Démographie

Répartition de la population par sexe et par âge au recensement de population de 2006



Source : Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Au 1^{er} janvier 2006, le Compiégnois compte 114 362 habitants, soit une **densité de 184,4 habitants au km²**. Cette densité est forte comparée aux densités de l'Oise (135,3 h/km²), de la Picardie (97,6 h/km²) et de la France métropolitaine (112,9 h/km²).

Les moins de 25 ans représentent 33,0 % des habitants du Compiégnois. Cette proportion est proche de celle de l'Oise (33,7 %) et de la Picardie (32,9 %) et supérieure à celle de la France métropolitaine (31,2 %).

Les 25-59 ans constituent 49,4 % de la population compiégnoise contre 49,2 % dans l'Oise, 47,9 % en Picardie et 47,5 % en France métropolitaine.

Les 75 ans et plus du Compiégnois représentent 6,8 % de la population contre 6,1 % dans l'Oise, 7,3 % en Picardie, et 8,3 % en France métropolitaine.

En 2003-2006, l'**indice conjoncturel de fécondité (ICF) est de 1,86 enfant par femme** dans le Compiégnois. L'Oise, la Picardie et la France métropolitaine ont des ICF plus élevés (respectivement 2,07 enfants par femme, 2,00 et 1,90) ce qui est dû à la seule communauté d'agglomération. En effet, l'indice est de 1,80 sur la communauté d'agglomération de Compiègne et de 2,14 pour les trois communautés de communes.

Sur les 6 145 naissances domiciliées dans le Compiégnois sur cette même période (soit 1 536 naissances par an en moyenne), 49 sont le fait de mères mineures, soit un taux de 8,0 pour 1 000. Ce taux est plus élevé que le taux national (5,6 ‰), proche du taux départemental (7,6 ‰) et inférieur au taux régional (9,6 ‰).

Parmi les naissances domiciliées dans le Compiégnois, 91,5 % ont eu lieu au sein même du pays (91,4 % à Compiègne même), 3,5 % dans le reste de l'Oise (2,0 % à Senlis) et 3,2 % dans le reste de la France.

Concernant les 4 448 décès domiciliés dans le Compiégnois en 2001-2005 (soit 741 décès en moyenne par an), 88,5 % ont été enregistrés dans le Compiégnois, 4,9 % dans le reste de l'Oise, 1,5 % dans la Somme, 0,8 % dans l'Aisne et 4,3 % hors Picardie.

Ces décès ont lieu pour **58,9 % d'entre eux dans un établissement hospitalier ou une clinique privée**, pour 24,4 % au domicile de la personne, pour 12,3 % en maison de retraite et pour 4,4 % sur la voie ou dans un lieu public, ou dans un autre lieu non précisé.

Ainsi en 2001-2005, le solde naturel (naissances retranchées des décès) est de 3 389 sur la période, soit **un excédent de 678 habitants par an**.

Données par EPCI




- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Population au 01/01/2006 | Taux d'accroissement annuel entre 1999 et 2006 (en %) | Proportion de moins de 25 ans (en%) au 01/01/2006 | Proportion de 75 ans et plus (en %) au 01/01/2006 |
|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| CC Basse Automne | 9 875 | +0,36 % | 33,1 | 6,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 16 266 | +0,39 % | 32,5 | 5,8 |
| CC Canton d'Attichy | 16 327 | +0,35 % | 31,4 | 6,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 71 894 | +0,55 % | 33,4 | 7,1 |
| Compiégnois | 114 362 | +0,48 % | 33,0 | 6,8 |
| Oise | 792 975 | +0,50 % | 33,7 | 6,1 |
| Picardie | 1 894 355 | +0,29 % | 32,9 | 7,3 |
| France métropolitaine | 61 399 541 | +0,71 % | 31,2 | 8,3 |

Source : Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — +0,37 % — 32,2 — 6,3



- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Nombre de naissances en 2003-2006 | Nombre de naissances dont la mère est mineure en 2003-2006 | Indice conjoncturel de fécondité en 2003-2006 (en nombre moyen d'enfant(s) par femme) |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 525 | 7 | 2,04 |
| CC Plaine d'Estrées | 845 | 1 | 2,40 |
| CC Canton d'Attichy | 787 | 7 | 2,02 |
| Secteur CA de Compiègne | 3 988 | 34 | 1,80 |
| Compiégnois | 6 145 | 49 | 1,86 |
| Oise | 43 223 | 327 | 2,07 |
| Picardie | 98 969 | 954 | 2,00 |
| France métropolitaine | 3 094 517 | 17 415 | 1,90 |

Source : Insee

Exploitation OR2S


Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 2,14

Social

En 2006, le **revenu net** imposable annuel moyen des habitants du pays du Compiégnois est de 22 972 €, ce qui est supérieur aux revenus des Isariens (22 207 €), des Picards (20 237 €) et des Français (21 930 €). Ainsi, la part de foyers non imposables est moins élevée dans le Compiégnois (41,2 % des foyers fiscaux en 2006) que dans l'Oise (42,3 %), qu'en Picardie (47,8 %) et qu'en France métropolitaine (46,4 %).

Le **niveau de formation des 15 ans et plus** en 2006 est proche dans le Compiégnois et en France métropolitaine : respectivement **39,1 % de la population sans qualification** (sans diplôme ou ayant le certificat d'études primaires ou le brevet des collèges) et 38,5 %. Ce taux est plus faible que dans l'Oise (42,1 %) et qu'en Picardie (45,2 %). Ce pourcentage est inférieur au niveau national sur la communauté d'agglomération de Compiègne avec 37,6 %.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Revenu net imposable annuel moyen en 2006 | Pourcentage de foyers non imposables en 2006 | Pourcentage de personnes sans qualification* au 1/01/2006 |
|-------------------------|---|--|---|
| CC Basse Automne | 22 322 € | 40,5 | 45,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 23 530 € | 37,2 | 40,6 |
| CC Canton d'Attichy | 22 951 € | 41,4 | 40,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 22 943 € | 42,2 | 37,6 |
| Compiégnois | 22 972 € | 41,2 | 39,1 |
| Oise | 22 207 € | 42,3 | 42,1 |
| Picardie | 20 237 € | 47,8 | 45,2 |
| France métropolitaine | 21 930 € | 46,4 | 38,5 |

Sources : DGI, Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI CA de Compiègne ————— 23 025 € ————— 39,6 ————— 41,7

* Sans diplôme ou ayant le certificat d'études primaires ou le brevet des collèges

Concernant l'**allocation adulte handicapé** (AAH), le taux du Compiégnois (**23,9 allocataires pour 1 000 personnes de 20-59 ans au 31 décembre 2007**) est proche de ceux de l'Oise (24,2 ‰) et de la France métropolitaine (23,8 ‰) et plus faible qu'en Picardie (30,1 ‰).

Dans le Compiégnois, 19 centres d'hébergement pour adultes en situation de handicap (hébergement ouvert en foyers de vie et accueil spécialisé) sont répartis sur les communes de Compiègne, Longueil-Sainte-Marie, Clairoix, Margny-lès-Compiègne, Cuise-la-Motte, Pierrefonds, Trosly-Breuil et Le Meux. Au total, ce sont 423 places pour les adultes handicapés.

Par ailleurs, quatre structures d'aide au travail pour travailleurs handicapés sont situées dans le pays (Compiègne, Longueil, Sainte-Marie, Trosly-Breuil et Jaux) totalisant 344 places.

Le Compiégnois compte **7,2 allocataires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)** pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans en 2007 contre 7,6 ‰ dans l'Oise, 8,4 ‰ en Picardie et 9,6 ‰ en France métropolitaine.


Pour les enfants et adolescents en situation de handicap, cinq centres d'hébergement spécialisés et de structure d'aide à l'éducation des enfants sont ouverts dans le Compiégnois (Compiègne et Chevières). Ils permettent d'accueillir 158 jeunes. Par ailleurs, un CMPP est recensé à Compiègne.

Au 31 décembre 2007, sont dénombrés **33,8 allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) pour 1 000 ménages** du Compiégnois. Ce taux est proche du taux de l'Oise (33,7 ‰) et inférieur à ceux de la Picardie (38,2 ‰) et de la France métropolitaine (39,4 ‰). Ce taux global marque cependant une différence sensible entre la communauté d'agglomération et les trois communautés de communes.

Par ailleurs, le taux d'allocataires du RMI âgés de 25 à 49 ans du Compiégnois (27,8 allocataires pour 1 000 personnes de 25-49 ans) est supérieur au département (26,1 ‰) et inférieur à la région (32,2 ‰) et au niveau national (35,8 ‰).

Les allocataires de l'**allocation parent isolé (API)** sont moins nombreux dans le Compiégnois (**94,4 allocataires pour 1 000 familles monoparentales** au 31 décembre 2007) qu'en Picardie (107,8 ‰), aussi nombreux que dans l'Oise (93,0 ‰) et davantage qu'en France métropolitaine (80,2 ‰). Là encore, la différence est importante entre la communauté d'agglomération et les trois communautés de communes.

Taux d'allocataires du RMI au 31 décembre 2007 (pour 1 000 ménages)




Sources : Caf, MSA, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S
* min : Sud de l'Oise ; ** max : Grand Creillois

Données par EPCI

| | Nombre d'allocataires de l'AAH au 31/12/2007 | Nombre d'allocataires de l'AEEH au 31/12/2007 | Taux d'allocataires de l'AAH (pour 1 000 personnes de 20-59 ans) au 31/12/2007 | Taux d'allocataires de l'AEEH (pour 1 000 personnes de moins de 20 ans) au 31/12/2007 |
|-------------------------|--|---|--|---|
| CC Basse Automne | 111 | 22 | 20,3 | 7,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 148 | 26 | 16,2 | 5,9 |
| CC Canton d'Attichy | 252 | 22 | 28,1 | 5,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 1 018 | 146 | 25,2 | 7,9 |
| Compiégnois | 1 528 | 216 | 23,9 | 7,2 |
| Oise | 10 590 | 1 659 | 24,2 | 7,6 |
| Picardie | 30 835 | 4 218 | 30,1 | 8,4 |
| France métropolitaine | 785 624 | 146 067 | 23,8 | 9,6 |

Sources : CAF, MSA, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S
Total EPCI hors CA de Compiègne — 21,7 — 6,1



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de Rmistes au 31/12/2007 | Taux de Rmistes (pour 1 000 ménages) au 31/12/2007 | Taux de Rmistes de 25-49 ans (pour 1 000 personnes de 25-49 ans) au 31/12/2007 |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| CC Basse Automne | 86 | 22,6 | 16,8 |
| CC Plaine d'Estrées | 72 | 11,9 | 9,3 |
| CC Canton d'Attichy | 108 | 17,9 | 10,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 1 302 | 42,6 | 37,7 |
| Compiégnois | 1 568 | 33,8 | 27,8 |
| Oise | 10 277 | 33,7 | 26,1 |
| Picardie | 28 869 | 38,2 | 32,2 |
| France métropolitaine | 1 028 154 | 39,4 | 35,8 |


Sources : CAF, MSA, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S
Total EPCI hors CA de Compiègne — 16,7 — 11,4

| | Nombre d'allocataires de l'API au 31/12/2007 | Taux d'allocataires de l'API (pour 1 000 familles monoparentales) au 31/12/2007 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 27 | 79,6 |
| CC Plaine d'Estrées | 15 | 44,6 |
| CC Canton d'Attichy | 25 | 56,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 303 | 107,8 |
| Compiégnois | 370 | 94,4 |
| Oise | 2 514 | 93,0 |
| Picardie | 7 170 | 107,8 |
| France métropolitaine | 177 108 | 80,2 |

Sources : CAF, MSA, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S
Total EPCI hors CA de Compiègne — 60,1

La CMU de base concerne **14,1 bénéficiaires pour 1 000 habitants du Compiégnois en 2006**, ce qui est supérieur au niveau de l'Oise (12,4 ‰) et inférieur à la Picardie (15,5 ‰) et à la France métropolitaine (23,1 ‰). Les allocataires de la CMU complémentaire sont au même niveau dans le Compiégnois (67,3 bénéficiaires pour 1 000 habitants) que dans le département (68,3 ‰) et qu'à l'échelon national (67,8 ‰), mais moins nombreux qu'en région (87,2 ‰). Des valeurs très basses sont observées dans les trois communautés de communes.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Nombre de bénéficiaires de la CMU de base en 2006 | Nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2006 | Taux de bénéficiaires de la CMU de base (pour 1 000 habitants) en 2006 | Taux de bénéficiaires de la CMU complémentaire (pour 1 000 habitants) en 2006 |
|-------------------------|---|--|--|---|
| CC Basse Automne | 61 | 351 | 6,2 | 35,6 |
| CC Plaine d'Estrées | 76 | 421 | 4,7 | 25,9 |
| CC Canton d'Attichy | 73 | 417 | 4,5 | 25,5 |
| Secteur CA de Compiègne | 1 406 | 6 507 | 19,5 | 90,5 |
| Compiégnois | 1 615 | 7 697 | 14,1 | 67,3 |
| Oise | 9 856 | 54 177 | 12,4 | 68,3 |
| Picardie | 29 286 | 165 164 | 15,5 | 87,2 |
| France métropolitaine* | 1 418 970 | 4 165 144 | 23,1 | 67,8 |


Sources : CPAM, MSA, RSI, Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — 4,9 — 28,0

* Les nombres et taux de France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2007. Ils ne sont donc pas directement comparables aux données présentées dans le pays, le département et la région. Pour comparaison suivant cette même source à cette même date, 15,6 bénéficiaires de la CMU de base et 75,9 bénéficiaires de la CMU complémentaire pour 1 000 habitants étaient dénombrés en Picardie.

Montant mensuel moyen des pensions vieillesse en 2007 (en euros)



Sources : Cram, MSA

Exploitation OR2S

* min : Thiérache ; ** max : Sud de l'Oise

Les personnes âgées résidant dans le Compiégnois ont reçu en moyenne mensuelle **663 € de pension vieillesse** en 2007. L'Oise (677 €) a un montant moyen plus élevé tandis que la Picardie (635 €) a un montant plus faible.

La proportion d'allocations supplémentaires versées en 2006 est proche dans le Compiégnois (2,2 % parmi l'ensemble des pensions vieillesse) de l'Oise (2,1 %) et de la Picardie (2,3 %).


Par ailleurs, on compte 23,7 % de pensions de réversion dans le Compiégnois au 31 décembre 2007 (22,6 % dans l'Oise et 25,0 % en Picardie).

Les personnes âgées du Compiégnois perçoivent moins l'aide personnalisée d'autonomie (Apa) à domicile que les Isariens, les Picards et les Français : **66,1 allocataires de l'Apa à domicile pour 1 000 personnes de 75 ans et plus dans le Compiégnois** au 31 décembre 2007, contre 74,2 ‰ dans l'Oise, 133,3 ‰ en Picardie et 127,4 ‰ en France entière.

Le taux de bénéficiaires de l'aide ménagère dans le pays (24,6 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004) est plus élevé dans le pays que les taux départemental (19,4 ‰), régional (20,4 ‰) et national (22,7 ‰).

NB : concernant les chiffres ci-dessus, il s'agit de montants moyens de pensions vieillesse versées en décembre 2007. Une même personne peut cumuler plusieurs pensions vieillesse, ce qui n'est pas additionné ici. Par ailleurs, pour le régime agricole, cela ne concerne que les salariés. Concernant les pensions de réversion, il a été retenu les prestataires bénéficiant d'une pension de réversion et éventuellement d'un autre droit.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Montant mensuel moyen des pensions vieillesse en 2007 | Pourcentage d'allocations supplémentaires (parmi l'ensemble des pensions vieillesse) au 31/12/2006* | Pourcentage de pensions de réversion (parmi l'ensemble des pensions vieillesse) au 31/12/2007 |
|-------------------------|---|---|---|
| CC Basse Automne | 675 € | 1,4 | 23,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 681 € | 1,2 | 23,1 |
| CC Canton d'Attichy | 703 € | 1,7 | 23,1 |
| Secteur CA de Compiègne | 646 € | 2,7 | 24,0 |
| Compiégnois | 663 € | 2,2 | 23,7 |
| Oise | 677 € | 2,1 | 22,6 |
| Picardie | 635 € | 2,3 | 25,0 |


Sources : Cram, MSA

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne 688 € — 1,4 — 23,3

* À partir du 13 janvier 2007, les personnes pouvant prétendre à l'allocation supplémentaire bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

| | Nombre de bénéficiaires de l'Apa à domicile au 31/12/2007 | Nombre de bénéficiaires de l'aide ménagère au 31/12/2004 | Nombre de bénéficiaires de l'Apa à domicile (pour 1 000 personnes de 75 ans et plus) au 31/12/2007 | Taux de bénéficiaires de l'aide ménagère (pour 1 000 personnes de 65 ans et plus) au 31/12/2004 |
|-------------------------|---|--|--|---|
| CC Basse Automne | 34 | 21 | 56,5 | 16,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 94 | 53 | 99,4 | 27,0 |
| CC Canton d'Attichy | 66 | 37 | 58,5 | 16,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 319 | 271 | 62,7 | 27,0 |
| Compiégnois | 513 | 382 | 66,1 | 24,6 |
| Oise | 3 611 | 1 984 | 74,2 | 19,4 |
| Picardie | 18 509 | 5 752 | 133,3 | 20,4 |
| France* | 662 000 | 232 000 | 127,4 | 22,7 |



- 0 15 30 km
- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne


Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **72,6** ————— **20,3**

* Les données pour la France concernent la France métropolitaine pour les aides ménagères et la France entière pour l'Apa à domicile.

Économie

Taux de chômage¹ au recensement de la population de 2006 (en %)



Source : Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

* min : Sud de l'Oise ; ** max : Grand Creillois

¹ Selon la définition de l'Insee et la déclaration des personnes lors du recensement

L'emploi du Compiégnois est dominé par l'**emploi ouvrier qui représente 27,1 % des emplois** en 2006, ce qui est proche du département (27,9 %), inférieur à la région (29,8 %) et plus élevé qu'au niveau national (23,4 %).

Les **employés** représentent plus d'un quart des emplois du Compiégnois (**26,1 %** en 2006), ce qui est inférieur aux taux départemental (28,3 %), régional (28,6 %) et national (28,5 %).

Les **professions intermédiaires** (25,2 % de l'emploi du Compiégnois, contre 25,3 % dans l'Oise, 23,6 % en Picardie et 24,6 % en France métropolitaine) et les **cadres** (respectivement **16,1 %** contre 12,6 %, 11,1 % et 15,5 %) constituent les troisième et quatrième catégories socioprofessionnelles du Compiégnois en 2006. La proportion de cadres est la deuxième plus élevée des pays picards (après le pays du Sud de l'Oise). Cette proportion approche même les 20 % sur la communauté d'agglomération de Compiègne.

Les agriculteurs exploitants ne représentent que 0,6 % des emplois, soit une proportion sensiblement plus faible que dans l'Oise (1,1 %), qu'en Picardie (2,1 %) et qu'en France métropolitaine (2,1 %).


Le **taux de chômage** au recensement de 2006 est de **10,5 %** dans le Compiégnois, ce qui est proche des taux départemental (10,9 %) et national (11,1 %) et plus faible qu'au niveau régional (12,1 %). Ce taux est même inférieur à 9 % sur les trois communautés de communes regroupées.

Au 31 décembre 2007, le Compiégnois compte **3 647 demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)** de catégorie 1, dont 50,2 % sont des femmes. Cette proportion est proche de celle de l'Oise (50,5 %) et supérieure à celles de la Picardie (49,0 %) et de la France métropolitaine (48,2 %).

Les **moins de 25 ans représentent 21,9 % des DEFM** du Compiégnois, ce qui est plus faible que dans le département (23,2 %) et qu'en région (24,7 %) mais plus fort qu'au niveau national (20,1 %).

Le **chômage de longue durée (plus d'un an d'ancienneté) touche 26,0 % des demandeurs d'emploi** du Compiégnois au 31 décembre 2007, contre 25,7 % dans l'Oise, 28,9 % en Picardie et 29,6 % en France métropolitaine.

Données par EPCI



- 0 15 30 km
- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Taux de chômage* au recensement au 1/01/2006 | Nombre de DEFM de catégorie 1 au 31/12/2007 | Pourcentage de moins de 25 ans parmi les DEFM de catégorie 1 au 31/12/2007 | Pourcentage de DEFM de plus d'un an d'ancienneté parmi les DEFM de catégorie 1 au 31/12/2007 |
|-------------------------|--|---|--|--|
| CC Basse Automne | 10,1 | 290 | 24,2 | 26,5 |
| CC Plaine d'Estrées | 7,5 | 391 | 26,7 | 27,3 |
| CC Canton d'Attichy | 9,0 | 410 | 21,5 | 27,8 |
| Secteur CA de Compiègne | 11,6 | 2 556 | 21,0 | 25,4 |
| Compiégnois | 10,5 | 3 647 | 21,9 | 26,0 |
| Oise | 10,9 | 26 439 | 23,2 | 25,7 |
| Picardie | 12,1 | 70 948 | 24,7 | 28,9 |
| France métropolitaine | 11,1 | 2 143 487 | 20,1 | 29,6 |

Sources : Pôle emploi, DRTEFP, Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **8,7** ————— **24,1** ————— **27,3**

* Selon la définition de l'Insee et la déclaration des personnes lors du recensement (en %).

Chapitre 2. État de santé

Données générales


Affections de longue durée

En 2004-2005, le Compiégnois compte **1 908,5 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD)** pour 100 000 habitants (soit 1 855 personnes en moyenne annuelle), ce qui est proche du département (1 957,7), de la région (1 946,5) et du niveau national (1 877,1 ; différence non significative).

Chez les femmes, 1 629,1 nouvelles admissions en ALD ont été enregistrées dans le Compiégnois en 2004-2005 pour 100 000 habitantes, soit 880 femmes en moyenne annuelle. Ce taux est proche de ceux observés dans l'Oise (1 689,3), en Picardie (1 664,4) et en France métropolitaine (1 606,5 ; différence non significative).

Le taux de nouvelles admissions en ALD chez les hommes est de 2 251,4 pour 100 000 en 2004-2005 (975 hommes en moyenne annuelle) contre 2 274,9 dans l'Oise, 2 283,8 en Picardie et 2 208,1 en France métropolitaine (différence non significative).

Nouveaux bénéficiaires de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD en 2004-2005 (pour 100 000 habitants)




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

* min : Vallées Bresles et Yeres ; ** max : Grand Creillois

Exploitation OR2S

Taux d'admissions en ALD pour les trois premières causes chez les femmes en 2004-2005 (pour 100 000 femmes)



Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S


Les nouvelles admissions féminines en ALD sont principalement liées aux tumeurs malignes, au diabète et à l'hypertension artérielle sévère.

Le taux concernant les ALD pour tumeurs malignes est de 407,3 pour 100 000 dans le Compiégnois en 2004-2005, soit 217 femmes en moyenne annuelle (404,8 dans le département, 411,3 en région et 410,6 au niveau national ; différence non significative).

Le taux d'admissions pour diabète dans le Compiégnois (243,7 pour 100 000, soit 128 femmes en moyenne annuelle) est plus faible que les taux de l'Oise (265,0) et de la Picardie (270,3) et n'est pas significativement différent de la France métropolitaine (219,7).

L'hypertension artérielle sévère a entraîné 140,9 nouvelles admissions en ALD pour 100 000 habitantes dans le Compiégnois en 2004-2005 (soit 76 femmes en moyenne annuelle) contre 206,4 dans l'Oise, 165,6 en Picardie et 162,8 en France métropolitaine (différence non significative).

Taux d'admissions en ALD pour les trois premières causes chez les hommes en 2004-2005 (pour 100 000 hommes)



Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S


Pour les hommes comme pour les femmes, les nouvelles admissions en ALD sont d'abord le fait de tumeurs malignes et de diabète. La maladie coronaire vient ensuite chez les hommes.

Les tumeurs malignes ont provoqué dans le Compiègnais 597,0 nouvelles admissions en 2004-2005 pour 100 000 hommes (594,4 dans l'Oise, 622,9 en Picardie et 591,3 en France métropolitaine ; différence non significative). Cela représente 251 hommes admis en ALD en moyenne par an.

Le taux d'admissions pour diabète dans le Compiègnais est de 330,9 pour 100 000, soit 150 hommes en moyenne annuelle (345,5 dans le département, 355,7 en région et 318,7 au niveau national ; différence non significative).

Enfin, le taux d'admissions pour la maladie coronaire (84 hommes en moyenne annuelle) est de 190,1 pour 100 000 dans le Compiègnais contre 222,6 dans l'Oise, 223,5 en Picardie et 217,5 en France métropolitaine ; différence non significative).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|---|------------|--------------|---|----------------|----------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 79 | 95 | 174 | 1 727,0 | 2 575,3 | 2 096,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 114 | 142 | 256 | 1 594,9 | 2 223,4 | 1 901,6 |
| CC Canton d'Attichy | 120 | 129 | 249 | 1 511,1 | 1 877,6 | 1 686,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 567 | 609 | 1 177 | 1 661,7 | 2 332,5 | 1 951,5 |
| Compiègnais | 880 | 975 | 1 855 | 1 629,1 | 2 251,4 | 1 908,5 |
| Oise | 6 057 | 6 907 | 12 964 | 1 689,3 | 2 274,9 | 1 957,7 |
| Picardie | 15 492 | 17 629 | 33 121 | 1 664,4 | 2 283,8 | 1 946,5 |
| France métropolitaine | 523 087 | 576 896 | 1 099 982 | 1 606,5 | 2 208,1 | 1 877,1 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **1 592,1** ——— **2 153,6** ——— **1 858,4**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers*


En 2004-2005, on compte **35 000 séjours en hôpital** d'habitants du Compiégnois en moyenne par an (18 927 séjours concernant des femmes et 16 072 pour des hommes), soit un taux standardisé de 318,5 séjours pour 1 000 habitants. Ce taux est plus élevé que dans l'Oise (278,9 ‰) et qu'en Picardie (277,2 ‰).

Le taux de séjours pour les femmes est plus élevé dans le Compiégnois que dans le département et la région : respectivement 325,9 ‰ contre 284,9 ‰ et 281,8 ‰. Il en est de même pour les hommes : respectivement 317,9 ‰ contre 278,0 ‰ et 278,4 ‰.

Ces séjours ont lieu pour 83,5 % dans le Compiégnois et pour 3,0 % dans le reste du département de l'Oise. Par ailleurs, 4,9 % des séjours d'habitants du Compiégnois ont lieu à Paris, 2,8 % dans la Somme (Amiens), 1,1 dans l'Aisne et 4,7 % dans le reste de la France.

* voir en annexes le paragraphe concernant le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de séjours* en 2004-2005 | | | Taux de séjours* en 2004-2005 pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|--|---------|----------|--|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 467 | 1 218 | 2 685 | 304,5 | 280,4 | 290,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 292 | 2 105 | 4 397 | 291,7 | 290,1 | 288,3 |
| CC Canton d'Attichy | 2 614 | 2 275 | 4 889 | 321,8 | 305,7 | 312,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 12 554 | 10 475 | 23 029 | 338,3 | 332,5 | 331,6 |
| Compiégnois | 18 927 | 16 072 | 35 000 | 325,9 | 317,3 | 318,5 |
| Oise | 111 379 | 95 746 | 207 125 | 284,9 | 278,0 | 278,9 |
| Picardie | 272 999 | 235 063 | 508 063 | 281,8 | 278,4 | 277,2 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — 306,8 — 293,2 — 298,0

Les données pour la France ne sont pas disponibles au moment de la parution de ce document.

* Hors nouveaux-nés bien portants.


Mortalité

En 2000-2005, le Compiégnois a un taux de **mortalité générale de 970,4 pour 100 000** (891 décès annuels) contre 1 003,6 dans le département et 1 043,7 en région. Ce taux est significativement supérieur au niveau national (903,2), mais cela n'est le fait que des communautés de communes Basse Automne et canton d'Attichy.

Avant 65 ans, la mortalité est de **230,4 pour 100 000 habitants** du Compiégnois, ce qui est inférieur à la Picardie (259,6) et proche de l'Oise (238,6) et de la France métropolitaine (219,4 ; différence non significative). Ceci représente 206 décès annuels moyens entre 2000 et 2005 dans le Compiégnois. À noter la sous-mortalité significative dans la communauté de communes de Plaine d'Estrées.

En 1995-2005, le Compiégnois a un taux de **mortalité infantile de 4,4 pour 1 000 naissances vivantes** (4,8 ‰ dans l'Oise, 4,8 ‰ en Picardie et 4,3 ‰ en France métropolitaine). Cela représente sur la zone 7 enfants qui décèdent en moyenne par an avant leur premier anniversaire.

Taux standardisé de mortalité générale en 2000-2005 (pour 100 000 habitants)




Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

* min : Vallées Bresles et Yeres ; ** max : Trait Vert - Santerre Initiatives

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès en 2000-2005 (hommes+femmes) | | Taux pour 100 000 habitants en 2000-2005 (hommes+femmes) | | Taux de mortalité infantile, pour 1 000 naissances vivantes en 1995-2005 |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | Mortalité générale | Mortalité prématurée (avant 65 ans) | Mortalité générale | Mortalité prématurée (avant 65 ans) | |
| CC Basse Automne | 75 | 22 | 1 015,5 | 269,4 | 2,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 100 | 24 | 882,8 | 182,5 | 3,2 |
| CC Canton d'Attichy | 166 | 31 | 1 175,4 | 226,3 | 5,5 |
| Secteur CA de Compiègne | 550 | 129 | 935,2 | 239,3 | 4,7 |
| Compiégnois | 891 | 206 | 970,4 | 230,4 | 4,4 |
| Oise | 5 912 | 1 508 | 1 003,6 | 238,6 | 4,8 |
| Picardie | 16 719 | 3 913 | 1 043,7 | 259,6 | 4,8 |
| France métropolitaine | 529 080 | 107 883 | 903,2 | 219,4 | 4,3 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **1 041,3** ——— **218,9** ——— **3,9**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.


Tumeurs

Ensemble des tumeurs

Affections de longue durée

Les **tumeurs malignes** représentent un **taux de nouvelles admissions en ALD de 484,0 pour 100 000 habitants** du Compiégnois en 2004-2005, soit 468 personnes en moyenne annuelle. Ce taux n'est pas significativement différent de celui de la France métropolitaine (483,1 ; 482,4 dans l'Oise et 497,8 en Picardie).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour tumeurs en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD pour tumeurs (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|--|---------|----------|--|--------------|--------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 17 | 25 | 43 | 371,5 | 693,0 | 506,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 29 | 42 | 70 | 401,9 | 698,4 | 530,5 |
| CC Canton d'Attichy | 31 | 36 | 68 | 397,0 | 521,3 | 458,5 |
| Secteur CA de Compiègne | 140 | 148 | 288 | 417,6 | 579,7 | 478,7 |
| Compiégnois | 217 | 251 | 468 | 407,3 | 597,0 | 484,0 |
| Oise | 1 457 | 1 719 | 3 175 | 404,8 | 594,4 | 482,4 |
| Picardie | 3 787 | 4 646 | 8 433 | 411,3 | 622,9 | 497,8 |
| France métropolitaine | 130 821 | 152 291 | 283 112 | 410,6 | 591,3 | 483,1 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **390,6** ——— **624,1** ——— **494,6**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

En 2004-2005, 2 476 séjours hospitaliers d'habitants du Compiégnois en moyenne annuelle ont comme diagnostics principal et relié des tumeurs. Ceci représente un taux de 24,1 séjours pour 1 000 habitants (18,2 % chez les femmes et 32,1 % chez les hommes), ce qui est identique à l'Oise (24,2 %) et supérieur à la Picardie (22,8 %).

Mortalité

La mortalité par tumeurs est significativement plus élevée dans le Compiégnois (**276,3 pour 100 000**) ; 278,6 dans l'Oise et 286,8 en Picardie) qu'en France métropolitaine (259,6) et représente 257 décès annuels moyens d'habitants du Compiégnois en 2000-2005.

Parmi les cancers, ceux de la trachée, des bronches et du poumon constituent la principale cause de mortalité par cancer dans le Compiégnois : 52,0 pour 100 000 (49 décès annuels moyens) contre 49,3 dans l'Oise, 50,2 en Picardie et 44,3 en France métropolitaine (significativement inférieur au Compiégnois). Au deuxième rang des décès par cancers, se trouve le cancer du côlon-rectum avec un taux de 24,7 pour 100 000 en 2000-2005 (23 décès annuels moyens), ce qui est plus faible que dans le département (25,5) et qu'en région (28,6) et proche du niveau national (27,3 ; différence non significative).

Enfin, au troisième rang, les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) ont un taux de mortalité de 17,2 pour 100 000 dans le Compiégnois en 2000-2005 (17 décès annuels moyens) contre 20,2 dans le département, 22,0 en région et 17,0 au niveau national (différence non significative).

Chez les femmes, les deux premières causes de décès par cancers sont le cancer du sein puis celui du côlon-rectum*. Enfin, la troisième cause de décès par cancers chez les femmes est le cancer de la trachée, des bronches et du poumon (9 décès annuels moyens) avec un taux de 17,4 pour 100 000 en 2000-2005 (contre 15,4 dans l'Oise, 14,4 en Picardie et 15,2 en France métropolitaine).

Chez les hommes, les trois premières causes de décès par cancers sont le cancer de la trachée, des bronches et du poumon, le cancer de la prostate** et celui des VADS. Le taux de mortalité du cancer de la trachée, des bronches et du poumon chez les hommes est de 98,3 pour 100 000 dans le Compiégnois en 2000-2005 contre 93,4 dans le département, 96,3 en région et 82,3 au niveau national. Il représente 40 décès annuels moyens dans le Compiégnois.

Le cancer des voies aérodigestives supérieures représente un taux de mortalité de 33,2 pour 100 000 hommes du Compiégnois en 2000-2005 (14 décès d'hommes en moyenne par an), ce qui est inférieur à l'Oise (38,3) et à la Picardie (42,0) et proche de la France métropolitaine (32,4 ; différence non significative).

* Ces cancers seront vus plus en détail dans la suite du document.

** Ce cancer sera vu plus en détail dans la suite du document.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès en 2000-2005 (hommes+femmes) | | Taux pour 100 000 habitants en 2000-2005 (hommes+femmes) | |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | Mortalité générale par tumeurs | Mortalité prématurée par tumeurs | Mortalité générale par tumeurs | Mortalité prématurée par tumeurs |
| CC Basse Automne | 21 | 9 | 274,3 | 111,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 33 | 10 | 268,9 | 75,1 |
| CC Canton d'Attichy | 39 | 13 | 272,7 | 97,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 165 | 51 | 279,8 | 97,6 |
| Compiégnois | 257 | 83 | 276,3 | 95,4 |
| Oise | 1 714 | 594 | 278,6 | 96,2 |
| Picardie | 4 739 | 1 526 | 286,8 | 103,1 |
| France métropolitaine | 150 742 | 42 945 | 256,9 | 88,1 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **271,3** ————— **92,5**


Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Affections de longue durée

Le taux d'admissions en ALD au titre d'un **cancer de la prostate** est plus élevé dans le Compiégnois (224,9 pour 100 000 en 2004-2005) que dans le département (203,9) et qu'en région (209,5) et n'est pas significativement différent du niveau national (198,0). En tout, ce sont 90 hommes du pays en moyenne par an qui sont nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD pour un cancer de la prostate.

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour cancer de la prostate en 2004-2005 | Taux de nouvelles admissions en ALD pour cancer de la prostate (pour 100 000 hommes) en 2004-2005 |
|-------------------------|---|---|
| CC Basse Automne | 11 | 327,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 18 | 314,5 |
| CC Canton d'Attichy | 12 | 174,8 |
| Secteur CA de Compiègne | 49 | 203,0 |
| Compiégnois | 90 | 224,9 |
| Oise | 547 | 203,9 |
| Picardie | 1 499 | 209,5 |
| France métropolitaine | 50 033 | 198,0 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 259,4

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.


Séjours hospitaliers

Le cancer de la prostate a provoqué **149 séjours d'habitants** du Compiégnois en moyenne par an en 2004-2005, soit un taux de 3,6 séjours pour 1 000 hommes. Ce taux est proche des taux départemental (3,7 ‰) et régional (3,8 ‰).

Mortalité

Le cancer de la prostate constitue un **taux de mortalité de 46,5 décès pour 100 000 habitants dans le Compiégnois** contre 50,4 dans l'Oise, 53,7 en Picardie et 44,5 en France métropolitaine (différence non significative). Les cancers de la prostate représentent 14 décès en moyenne annuelle dans le Compiégnois sur la période 2000-2005.

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de décès par cancer de la prostate en 2000-2005 | Taux de mortalité par cancer de la prostate (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 |
|-------------------------|---|---|
| CC Basse Automne | 1 | 36,8 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 30,7 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 50,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 10 | 49,7 |
| Compiégnois | 14 | 46,5 |
| Oise | 102 | 50,4 |
| Picardie | 298 | 53,7 |
| France métropolitaine | 9 174 | 44,5 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 41,5

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.


Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Cancer du sein*

Affections de longue durée

Le taux d'admissions en ALD pour **cancer du sein est de 173,9 pour 100 000** dans le Compiégnois en 2004-2005 (92 femmes en moyenne par an) contre 169,8 dans l'Oise, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine (différence non significative).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour cancer du sein en 2004-2005 (femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour cancer du sein (pour 100 000 femmes) en 2004-2005 |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 7 | 152,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 13 | 174,3 |
| CC Canton d'Attichy | 15 | 183,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 58 | 174,9 |
| Compiégnois | 92 | 173,9 |
| Oise | 618 | 169,8 |
| Picardie | 1 580 | 172,6 |
| France métropolitaine | 54 841 | 175,3 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne **171,4**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers


Annuellement, entre 2004 et 2005, 250 séjours hospitaliers (en diagnostics principal et relié) de femmes du Compiégnois ont été recensés pour cancer du sein, soit un taux de 4,5 pour 1 000 femmes. Ce taux est proche de ceux constatés dans l'Oise et en Picardie (respectivement 4,6 ‰ et 4,2 ‰).

Mortalité

Chez les femmes du Compiégnois, la première cause de décès par cancer est le cancer du sein.

Le taux de mortalité par **cancer du sein est de 36,3 pour 100 000** en 2000-2005 dans le Compiégnois (36,3 dans l'Oise et 37,3 en Picardie), ce qui n'est pas significativement différent de la France métropolitaine (33,1). Le cancer du sein a entraîné en moyenne le décès de 20 femmes par an dans le Compiégnois sur la période 2000-2005.

Taux standardisé de mortalité par cancer du sein en 2000-2005 (pour 100 000 femmes)




Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

* min : Sud de l'Aisne ; ** max : Chaunois

Exploitation OR2S

* cf. page 48 à consulter également concernant le dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans.

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de décès par cancer du sein en 2000-2005 (femmes) | Taux de mortalité par cancer du sein (pour 100 000 femmes en 2000-2005 (femmes)) |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 3 | 59,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 | 25,5 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 30,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 13 | 37,3 |
| Compiégnois | 20 | 36,3 |
| Oise | 129 | 36,3 |
| Picardie | 352 | 37,3 |
| France métropolitaine | 11 084 | 33,1 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 34,8

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif. Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Cancer du côlon-rectum*


Affections de longue durée

Le cancer du côlon-rectum concerne **47 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée en moyenne annuelle sur 2004-2005** dans le Compiégnois (25 hommes et 22 femmes), soit un taux d'admissions en ALD de 50,5 pour 100 000. Ce taux n'est pas significativement différent du taux français (48,4 ; 45,8 dans l'Oise et 46,8 en Picardie).

Les hommes du Compiégnois ont un taux de nouvelles admissions en ALD plus élevé que celui des femmes : 63,5 pour 100 000 pour les hommes contre 42,3 pour les femmes (respectivement 55,6 et 37,7 dans l'Oise ; 58,0 et 38,0 en Picardie et 60,8 et 39,1 en France métropolitaine).

* cf. page 48, consulter le dépistage organisé du cancer côlon-rectum.

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|---|--------|----------|---|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 0* | 0* | 1 | 8,6 | 8,9 | 8,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 3 | 4 | 7 | 45,2 | 70,9 | 57,1 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 6 | 8 | 28,4 | 83,1 | 55,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 17 | 14 | 31 | 49,5 | 62,1 | 53,3 |
| Compiégnois | 22 | 25 | 47 | 42,3 | 63,5 | 50,5 |
| Oise | 132 | 157 | 289 | 37,7 | 55,6 | 45,8 |
| Picardie | 354 | 424 | 777 | 38,0 | 58,0 | 46,8 |
| France métropolitaine | 13 034 | 15 271 | 28 305 | 39,1 | 60,8 | 48,4 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 29,3 ————— 63,6 ————— 45,2

* Pour cet EPCI, on compte 1 seul décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an.

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif. Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

Le cancer du côlon-rectum a impliqué en 2004-2005, 95 séjours hospitaliers de femmes du Compiégnois et 100 séjours d'hommes en moyenne par an. Ceci représente des taux respectifs de 1,7 pour 1 000 femmes et 2,4 pour 1 000 hommes. Le taux féminin est équivalent aux taux de l'Oise et de la Picardie (respectivement 1,8 ‰ et 1,7 ‰), tandis que le taux masculin en est plus faible (3,0 ‰ et 2,9 ‰ respectivement).

Le taux pour les deux sexes est de 2,0 séjours pour 1 000 habitants du Compiégnois (2,3 ‰ dans le département et 2,2 ‰ en région).


Mortalité

Le cancer du côlon-rectum constitue la deuxième cause de mortalité par cancer dans le Compiégnois, avec 23 décès annuels moyens entre 2000 et 2005, soit un taux de **24,7 pour 100 000** (25,5 dans l'Oise et 28,6 en Picardie). Ce taux n'est pas significativement différent de celui de la France métropolitaine (27,3).

Le cancer du côlon-rectum est la deuxième cause de mortalité chez les femmes du Compiégnois. Cela représente **13 décès annuels** moyens, entre 2000 et 2005, soit un taux de 22,0 décès pour 100 000 habitants (20,7 dans l'Oise, 21,9 en Picardie et 20,9 en France métropolitaine ; différence non significative).

Chez les hommes, la mortalité pour ce cancer est de 26,3 décès pour 100 000 habitants du Compiégnois (10 décès annuels en moyenne entre 2000 et 2005). Ce taux est plus faible que ceux du département (32,9), de la région (38,4) et du niveau national (36,9 ; différence significative).

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de décès par cancer du côlon-rectum en 2000-2005 | | | Taux de mortalité par cancer du côlon-rectum (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 1 | 2 | 23,4 | 23,9 | 18,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 | 1 | 3 | 23,1 | 21,7 | 19,5 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 2 | 3 | 15,3 | 23,4 | 30,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 9 | 7 | 15 | 23,1 | 25,7 | 27,5 |
| Compiégnois | 13 | 10 | 23 | 22,0 | 24,7 | 26,3 |
| Oise | 70 | 81 | 151 | 20,2 | 25,5 | 32,9 |
| Picardie | 212 | 249 | 461 | 21,9 | 28,6 | 38,4 |
| France métropolitaine | 7 490 | 8 492 | 15 982 | 20,9 | 27,3 | 36,9 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — 20,0 — 23,8 — 22,8

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Cancer de l'utérus*

Affections de longue durée

En 2004-2005, le **cancer de l'utérus est la cause de 12 admissions en ALD** de femmes du Compiégnois en moyenne par an, soit un taux de 21,7 femmes pour 100 000 (26,9 dans l'Oise et 30,3 en Picardie). Ce taux n'est pas significativement supérieur à celui de la France métropolitaine (24,2).

Séjours hospitaliers

Le cancer de l'utérus a entraîné sur cette même période, **40 hospitalisations de femmes** du Compiégnois en moyenne par an. Ceci représente un taux d'hospitalisations de 0,7 séjour pour 1 000 femmes, ce qui est proche des taux de l'Oise (0,8 ‰) et de la Picardie (0,9 ‰).

Mortalité

Entre 2000 et 2005, le taux de mortalité par cancer de l'utérus est de 8,0 décès pour 100 000 femmes dans le Compiégnois contre 10,6 dans le département, 11,0 en région et 8,6 au niveau national (différence non significative). Ce cancer représente 4 décès de femmes du Compiégnois en moyenne par an entre 2000 et 2005.

* Le cancer de l'utérus comprend les cancers du col et du corps. Le dépistage (frottis), en revanche, ne concerne que le cancer du col de l'utérus (cf. page 48).

Maladies de l'appareil circulatoire

Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire

Affections de longue durée


Les maladies de l'appareil circulatoire sont également génératrices de nombreuses admissions pour une exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD.

Ainsi, le **taux de nouvelles admissions en ALD en 2004-2005 pour pathologie cardiaque grave est de 140,1 pour 100 000 habitants** du Compiégnois (129 personnes en moyenne annuelle). Ce taux est identique à celui de la France métropolitaine (140,1) et inférieur à celui de l'Oise (153,1) et de la Picardie (149,7).

Les admissions pour **maladie coronaire** constituent un taux de **126,4 pour 100 000** dans le Compiégnois (soit 122 personnes en moyenne par an) contre 147,1 dans le département, 150,0 en région et 140,8 au niveau national (différence non significative).

Autre pathologie importante, l'**hypertension artérielle sévère** a entraîné **156,8 nouvelles admissions en ALD pour 100 000 habitants du Compiégnois** en 2004-2005 (145 personnes en moyenne annuelle). Ce taux est de 203,9 dans l'Oise, de 164,4 en Picardie et de 170,2 en France métropolitaine (différence non significative avec le Compiégnois).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour pathologie cardiaque grave en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour pathologie cardiaque grave (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 15 | 193,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 18 | 156,9 |
| CC Canton d'Attichy | 20 | 142,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 76 | 130,6 |
| Compiégnois | 129 | 140,1 |
| Oise | 939 | 153,1 |
| Picardie | 2 458 | 149,7 |
| France métropolitaine | 81 859 | 140,1 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne **158,1**

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour maladie coronaire en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour maladie coronaire (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 13 | 156,8 |
| CC Plaine d'Estrées | 21 | 153,4 |
| CC Canton d'Attichy | 14 | 98,8 |
| Secteur CA de Compiègne | 73 | 123,7 |
| Compiégnois | 122 | 126,4 |
| Oise | 962 | 147,1 |
| Picardie | 2 533 | 150,0 |
| France métropolitaine | 82 414 | 140,8 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne **131,8**

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour hypertension artérielle sévère en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour hypertension artérielle sévère (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 15 | 196,5 |
| CC Plaine d'Estrées | 21 | 163,2 |
| CC Canton d'Attichy | 12 | 81,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 97 | 167,3 |
| Compiégnois | 145 | 156,8 |
| Oise | 1 285 | 203,9 |
| Picardie | 2 731 | 164,4 |
| France métropolitaine | 99 547 | 170,2 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne **137,3**


Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

Entre 2004 et 2005, les maladies de l'appareil circulatoire ont entraîné annuellement **2 107 séjours en hôpital** d'habitants du Compiégnois (927 femmes et 1 180 hommes), soit un taux de 20,9 séjours pour 1 000 habitants contre 25,7 ‰ dans l'Oise et 26,8 ‰ en Picardie. Les séjours en hôpital pour cette pathologie sont plus importants chez les hommes (27,3 ‰) que chez les femmes (16,1 ‰).

Données par EPCI



| | Nombre annuel moyen de séjours pour maladies de l'appareil circulatoire en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) | | | Taux de séjours pour maladies de l'appareil circulatoire en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|---|--------|----------|---|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 87 | 103 | 191 | 18,8 | 28,5 | 22,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 120 | 175 | 294 | 16,1 | 28,0 | 21,4 |
| CC Canton d'Attichy | 138 | 174 | 312 | 16,7 | 26,0 | 21,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 581 | 728 | 1 309 | 15,6 | 27,4 | 20,5 |
| Compiégnois | 927 | 1 180 | 2 107 | 16,1 | 27,3 | 20,9 |
| Oise | 7 633 | 9 698 | 17 330 | 20,3 | 32,3 | 25,7 |
| Picardie | 20 993 | 25 910 | 46 902 | 21,2 | 33,8 | 26,8 |


Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — 17,0 — 27,2 — 21,5

Mortalité

Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire en 2000-2005 (pour 100 000 habitants)



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S


Exploitation OR2S

* min : Grand Creillois ; ** max : Chaunois

La mortalité par maladies de l'appareil circulatoire n'est pas significativement plus importante dans le Compiégnois (**281,2 pour 100 000 en 2000-2005**) qu'en France métropolitaine (267,4 ; 290,6 dans l'Oise et 307,6 en Picardie). Elle est même significativement inférieure dans la communauté d'agglomération de Compiègne. Les maladies de l'appareil circulatoire représentent 251 décès annuels moyens dans le Compiégnois sur la période 2000-2005.

Les maladies de l'appareil circulatoire, fortement liées à la consommation de tabac, ont un taux de **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) moins important dans le Compiégnois que dans l'Oise et qu'en Picardie : 30,9 pour 100 000, contre 33,6 dans l'Oise et 38,2 en Picardie. Le taux du Compiégnois est proche de celui de la France métropolitaine (30,2 ; différence non significative). Cela représente 27 décès annuels moyens de personnes de moins de 65 ans en 2000-2005 dans le Compiégnois.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès en 2000-2005 (hommes+femmes) | | Taux pour 100 000 habitants en 2000-2005 (hommes+femmes) | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | Mortalité générale par maladies de l'appareil circulatoire | Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire | Mortalité générale par maladies de l'appareil circulatoire | Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire |
| CC Basse Automne | 21 | 3 | 301,4 | 42,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 32 | 3 | 307,5 | 26,6 |
| CC Canton d'Attichy | 53 | 4 | 377,9 | 30,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 145 | 16 | 251,4 | 30,7 |
| Compiégnois | 251 | 27 | 281,2 | 30,9 |
| Oise | 1 630 | 209 | 290,6 | 33,6 |
| Picardie | 4 792 | 568 | 307,6 | 38,2 |
| France métropolitaine | 156 261 | 14 790 | 267,4 | 30,2 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **337,3** ————— **31,1**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.


Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Accidents vasculaires cérébraux

Affections de longue durée

En 2004-2005, les **accidents vasculaires cérébraux** (AVC) ont entraîné un taux de nouvelles admissions en ALD de **68,4 pour 100 000 dans le Compiégnois** (65 personnes en moyenne annuelle) contre 57,4 dans l'Oise, 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine (différence non significative).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour accident vasculaire cérébral invalidant en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour accident vasculaire cérébral invalidant (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|--|--|
| CC Basse Automne | 5 | 62,3 |
| CC Plaine d'Estrées | 7 | 52,6 |
| CC Canton d'Attichy | 11 | 78,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 42 | 70,6 |
| Compiégnois | 65 | 68,4 |
| Oise | 364 | 57,4 |
| Picardie | 935 | 56,1 |
| France métropolitaine | 35 378 | 60,5 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **65,9**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

En 2004-2005, le taux de séjours hospitaliers pour accident vasculaire cérébral d'habitants du Compiégnois est de **2,4 séjours pour 1 000 habitants**. Ce taux est inférieur au taux du département (2,8 ‰) et proche de la région (2,6 ‰).

Le taux est plus élevé chez les hommes (3,1 ‰) que chez les femmes (1,8 ‰). Les hommes et les femmes du Compiégnois ont des taux plus faibles que dans l'Oise et qu'en Picardie (respectivement 3,4 ‰ et 3,3 ‰ pour les hommes et 2,4 ‰ et 2,1 ‰ pour les femmes).

Données par EPCI



0 15 30 km

- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de séjours pour accident vasculaire cérébral en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) | | | Taux de séjours pour accident vasculaire cérébral en 2004-2005 (diagnostics principal et relié), pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|--|--------|----------|---|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 4 | 11 | 15 | 0,9 | 3,3 | 1,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 9 | 17 | 27 | 1,3 | 2,7 | 2,0 |
| CC Canton d'Attichy | 18 | 22 | 41 | 2,2 | 3,2 | 2,8 |
| Secteur CA de Compiègne | 71 | 78 | 149 | 1,9 | 3,1 | 2,4 |
| Compiégnois | 103 | 129 | 231 | 1,8 | 3,1 | 2,4 |
| Oise | 887 | 932 | 1 820 | 2,4 | 3,4 | 2,8 |
| Picardie | 2 156 | 2 347 | 4 503 | 2,1 | 3,3 | 2,6 |

Sources : Atih, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **1,6** ————— **3,0** ————— **2,3**

Mortalité

Les maladies vasculaires cérébrales constituent une mortalité en population générale de **70,1 décès pour 100 000** habitants du Compiégnois en 2000-2005, contre 65,7 dans l'Oise et 68,1 en Picardie. Ce taux est significativement supérieur à celui de la France métropolitaine (62,1) et représente 63 décès annuels moyens dans le Compiégnois. Toutefois, cette surmortalité n'est constatée que sur les trois communautés de communes.

La mortalité prématurée par AVC dans le Compiégnois (7,6 pour 100 000 ; 7,0 dans l'Oise et 7,5 en Picardie) n'est pas significativement supérieure à la mortalité observée en France métropolitaine (6,0). Avant 65 ans, les accidents vasculaires cérébraux ont engendré annuellement 7 décès dans le Compiégnois entre 2000 et 2005.

Données par EPCI



0 15 30 km

- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès par accident vasculaire cérébral en 2000-2005 (hommes+femmes) | Taux de mortalité par accident vasculaire cérébral (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|--|--|
| CC Basse Automne | 5 | 70,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 8 | 80,2 |
| CC Canton d'Attichy | 15 | 107,1 |
| Secteur CA de Compiègne | 35 | 59,6 |
| Compiégnois | 63 | 70,1 |
| Oise | 366 | 65,7 |
| Picardie | 1 061 | 68,1 |
| France métropolitaine | 36 292 | 62,1 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **89,7**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Affections de longue durée

En 2004-2005, les cardiopathies ischémiques ont entraîné 57 nouvelles admissions en ALD par an (38 hommes et 19 femmes en moyenne annuelle), soit un taux de 59,2 pour 100 000. Ce taux est plus faible que dans le département (79,3), qu'en région (82,2) et qu'au niveau national (80,7 ; différence significative).

Par ailleurs, le taux masculin est plus du double de celui des femmes : respectivement 86,0 pour 100 000 et 34,5 dans le Compiégnois.

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour cardiopathies ischémiques en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD pour cardiopathies ischémiques (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 2 | 3 | 5 | 31,3 | 103,3 | 58,3 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 | 8 | 9 | 26,7 | 112,3 | 70,3 |
| CC Canton d'Attichy | 3 | 4 | 7 | 40,2 | 46,0 | 44,5 |
| Secteur CA de Compiègne | 12 | 23 | 36 | 35,7 | 88,1 | 60,5 |
| Compiégnois | 19 | 38 | 57 | 34,5 | 86,0 | 59,2 |
| Oise | 145 | 370 | 514 | 41,7 | 121,5 | 79,3 |
| Picardie | 434 | 950 | 1 384 | 46,1 | 123,1 | 82,2 |
| France métropolitaine | 14 552 | 32 650 | 47 202 | 42,5 | 125,0 | 80,7 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **32,1** ————— **82,4** ————— **56,6**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif. Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

Les cardiopathies ischémiques ont entraîné, en diagnostics principal et relié, 340 séjours en hôpital d'habitants du Compiégnois par an en 2004-2005 (81 séjours de femmes et 260 séjours d'hommes).

Le taux de séjours est de 3,4 pour 1 000 habitants en 2004-2005 contre 5,8 ‰ dans l'Oise et 5,8 ‰ en Picardie. Les taux sont moins élevés pour les femmes (1,4 ‰ dans le Compiégnois, 3,1 ‰ dans l'Oise et 3,3 ‰ en Picardie) que pour les hommes (respectivement 6,2 ‰, 8,8 ‰ et 8,9 ‰).

| | Nombre annuel moyen de séjours pour cardiopathies ischémiques en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) | | | Taux de séjours pour cardiopathies ischémiques en 2004-2005 (diagnostics principal et relié), pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|---|--------|----------|--|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 8 | 25 | 33 | 1,9 | 5,9 | 4,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 13 | 36 | 50 | 1,9 | 4,6 | 3,6 |
| CC Canton d'Attichy | 10 | 30 | 40 | 1,2 | 6,7 | 2,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 49 | 169 | 218 | 1,3 | 5,7 | 3,5 |
| Compiégnois | 81 | 260 | 340 | 1,4 | 6,2 | 3,4 |
| Oise | 1 147 | 2 754 | 3 901 | 3,1 | 8,8 | 5,8 |
| Picardie | 3 240 | 7 018 | 10 258 | 3,3 | 8,9 | 5,8 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **1,6** ————— **5,5** ————— **3,3**

Mortalité

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, les cardiopathies ischémiques ont entraîné une mortalité de 74,2 pour 100 000 en population générale (67 décès annuels moyens) et de 10,4 en mortalité prématurée dans le Compiégnois (9 décès annuels moyens) en 2000-2005.

Le taux de mortalité générale du Compiégnois n'est pas significativement plus élevé que celui de la France métropolitaine (80,2 dans l'Oise et 84,7 en Picardie) ; il en est de même pour la mortalité prématurée (10,4 contre 12,6 dans le département, 13,6 en région et 11,0 au niveau national). Toutefois, pour les cardiopathies ischémiques, il faut souligner la différence importante entre la communauté d'agglomération et les trois communautés de communes regroupées (sous-mortalité par rapport au niveau national pour la première, surmortalité pour les secondes).


| | Nombre annuel moyen de décès par cardiopathies ischémiques en 2000-2005 (hommes+femmes) | Taux de mortalité par cardiopathies ischémiques (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|---|---|
| CC Basse Automne | 6 | 78,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 9 | 85,1 |
| CC Canton d'Attichy | 15 | 104,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 37 | 64,5 |
| Compiégnois | 67 | 74,2 |
| Oise | 457 | 80,2 |
| Picardie | 1 333 | 84,7 |
| France métropolitaine | 42 813 | 73,2 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **92,9**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif. Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

Pathologies liées à la consommation d'alcool

Affections de longue durée

En 2004-2005, les **maladies chroniques du foie et cirrhoses** ont entraîné 37 admissions en ALD par an dans le Compiégnois (22 hommes et 15 femmes en moyenne annuelle).

Le taux d'admissions en ALD est de **35,9 pour 100 000 habitants dans le pays**, ce qui n'est pas significativement différent de la France métropolitaine (37,7). L'Oise et la Picardie présentent des taux respectifs d'admissions en ALD de 36,9 et 32,4.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour maladies chroniques du foie et cirrhoses en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD pour maladies chroniques du foie et cirrhoses (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|---|--------|----------|---|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 1 | 2 | 22,7 | 27,2 | 23,8 |
| CC Plaine d'Estrées | 4 | 2 | 5 | 45,1 | 28,6 | 35,5 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 3 | 5 | 25,0 | 42,1 | 33,1 |
| Secteur CA de Compiègne | 8 | 16 | 24 | 24,8 | 55,0 | 38,8 |
| Compiégnois | 15 | 22 | 37 | 27,8 | 46,1 | 35,9 |
| Oise | 108 | 161 | 269 | 29,5 | 44,7 | 36,9 |
| Picardie | 231 | 342 | 573 | 25,5 | 39,9 | 32,4 |
| France métropolitaine | 8 210 | 13 939 | 22 149 | 26,9 | 49,2 | 37,7 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **32,4** ————— **34,2** ————— **32,2**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Mortalité

Les **pathologies liées à l'alcool** (cirrhoses, psychoses alcooliques et alcoolisme et cancers des voies aérodigestives supérieures) ont généré 38 décès par an entre 2000 et 2005 dans le Compiégnois (29 hommes et 9 femmes en moyenne annuelle). Ceci représente un **taux de mortalité de 37,9 pour 100 000**. Le Compiégnois est en dessous des moyennes départementale (40,7) et régionale (46,8) et n'est pas significativement supérieur au taux national (35,8).

Les hommes ont un taux de mortalité par pathologies liées à l'alcool près de quatre fois plus élevé que celui des femmes : 64,2 pour 100 000 contre 16,9.

Parmi ces pathologies, les cirrhoses du foie représentent 15 décès par an en moyenne (10 hommes et 5 femmes).


La **mortalité par cirrhose du foie est de 14,6 pour 100 000** dans le Compiégnois contre 14,9 dans le département, 18,2 en région et 13,7 au niveau national (différence non significative). Cette mortalité est également plus élevée chez les hommes que chez les femmes : 22,4 pour 100 000 contre 8,6.

Les **psychoses alcooliques et l'alcoolisme** ont été la cause de 7 décès par an en moyenne entre 2000 et 2005 dans le Compiégnois (5 hommes et 2 femmes), ce qui représente un **taux de mortalité de 6,1 pour 100 000**. Ce taux est proche des taux départemental (5,7), régional (6,6) et national (5,0 ; différence non significative).

Les hommes devançant largement les femmes encore une fois, avec un taux de 8,6 pour 100 000 contre 3,4 chez les femmes.

Enfin, la mortalité par **cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)**, qui est **également liée au tabagisme**, est moins importante dans le Compiégnois (**17,2 pour 100 000** en 2000-2005) que dans le département (20,2) et qu'en région (22,0) et équivalente au niveau national (17,0 ; différence non significative).

Les hommes ont un taux de 33,2 pour 100 000 contre 4,8 pour les femmes, soit 14 hommes et 3 femmes du Compiégnois qui décèdent en moyenne par an d'un cancer des VADS.



- 1 : CC Plaine d'Estrées
2 : Secteur CA de Compiègne
3 : CC Canton d'Attichy
4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès pour les causes liées à l'alcool en 2000-2005 | | | Taux de mortalité pour les causes liées à l'alcool (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 2 | 3 | 27,8 | 35,7 | 31,9 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 3 | 4 | 11,8 | 54,8 | 31,2 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 5 | 7 | 20,2 | 73,0 | 43,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 6 | 19 | 25 | 16,3 | 69,0 | 39,4 |
| Compiégnois | 9 | 29 | 38 | 16,9 | 64,2 | 37,9 |
| Oise | 58 | 217 | 276 | 16,2 | 69,9 | 40,7 |
| Picardie | 171 | 642 | 813 | 18,3 | 80,4 | 46,8 |
| France métropolitaine | 4 525 | 16 565 | 21 091 | 14,0 | 62,1 | 35,8 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ——— **18,9** ——— **57,9** ——— **36,5**

NB : Les causes liées à l'alcool comprennent les cirrhoses, les psychoses alcooliques et alcoolisme et les cancers des voies aérodigestives supérieures.

| | Nombre annuel moyen de décès par cirrhoses en 2000-2005 | | | Taux de mortalité pour cirrhoses (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|---|--------|----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 1 | 1 | 15,3 | 15,4 | 14,3 |
| CC Plaine d'Estrées | 0* | 2 | 2 | 4,4 | 27,3 | 14,9 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 1 | 2 | 10,9 | 17,0 | 12,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 3 | 7 | 10 | 8,3 | 24,2 | 15,4 |
| Compiégnois | 5 | 10 | 15 | 8,6 | 22,4 | 14,6 |
| Oise | 31 | 70 | 101 | 8,6 | 22,3 | 14,9 |
| Picardie | 99 | 219 | 317 | 10,6 | 27,2 | 18,2 |
| France métropolitaine | 2 357 | 5 763 | 8 120 | 7,5 | 21,2 | 13,7 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ——— **9,5** ——— **20,5** ——— **13,9**

* Pour cet EPCI, on compte 2 décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an.

| | Nombre annuel moyen de décès pour psychoses alcooliques et alcoolisme en 2000-2005 (hommes+femmes) | Taux de mortalité pour psychoses alcooliques et alcoolisme (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 (hommes +femmes) |
|-------------------------|--|---|
| | CC Basse Automne | 1 |
| CC Plaine d'Estrées | 0* | 2,1 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 3,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 5 | 7,0 |
| Compiégnois | 7 | 6,1 |
| Oise | 41 | 5,7 |
| Picardie | 118 | 6,6 |
| France métropolitaine | 2 949 | 5,0 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ——— **4,8**

* Pour cet EPCI, on compte 2 décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an.

| | Nombre annuel moyen de décès par cancers des voies aérodigestives supérieures en 2000-2005 | | | Taux de mortalité par cancers des voies aérodigestives supérieures (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 0* | 0** | 1 | 4,3 | 7,9 | 6,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 0** | 1 | 2 | 5,6 | 25,2 | 14,3 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 4 | 4 | 7,1 | 51,1 | 27,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 2 | 9 | 10 | 4,4 | 34,3 | 17,0 |
| Compiégnois | 3 | 14 | 17 | 4,8 | 33,2 | 17,2 |
| Oise | 19 | 115 | 134 | 5,4 | 38,3 | 20,2 |
| Picardie | 50 | 328 | 378 | 5,3 | 42,0 | 22,0 |
| France métropolitaine | 1 567 | 8 455 | 10 023 | 4,7 | 32,4 | 17,0 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ——— **5,8** ——— **31,7** ——— **17,8**

* Pour cet EPCI, on compte 1 seul décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an.

** Pour cet EPCI, on compte 2 décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an.

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Pathologies liées à la consommation de tabac


Affections de longue durée

Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon a entraîné 38 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an dans le Compiégnois entre 2004 et 2005. Le taux d'admissions est de **39,8 pour 100 000**, ce qui est moins important que dans l'Oise (46,5) et qu'en Picardie (43,7). Ce taux n'est pas significativement différent de celui de la France métropolitaine (38,8).

Cette pathologie, comme toutes celles liées au tabac et à l'alcool, touche davantage les hommes que les femmes : 28 hommes admis en ALD par an dans le Compiégnois pour 10 femmes, soit des taux respectifs de 62,4 et 19,8 pour 100 000.

Les cardiopathies ischémiques (cf. page 24) font également partie des pathologies liées au tabac et ont un taux d'admissions en ALD inférieurs dans le Compiégnois aux entités géographiques de référence (différence significative avec le niveau national).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon en 2004-2005 | | | Taux de nouvelles admissions en ALD pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 2 | 3 | 17,6 | 54,9 | 35,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 8 | 8 | 12,3 | 113,6 | 59,9 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 4 | 5 | 8,2 | 60,4 | 33,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 8 | 14 | 22 | 24,4 | 51,9 | 37,4 |
| Compiégnois | 10 | 28 | 38 | 19,8 | 62,4 | 39,8 |
| Oise | 73 | 237 | 309 | 20,5 | 77,0 | 46,5 |
| Picardie | 146 | 601 | 747 | 15,9 | 77,3 | 43,7 |
| France métropolitaine | 5 299 | 17 429 | 22 728 | 16,7 | 65,7 | 38,8 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — **11,8** — **78,5** — **43,6**


Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

En 2004-2005, on compte 324 séjours hospitaliers d'habitants du Compiégnois en moyenne par an ayant comme diagnostics principal et relié le cancer de la trachée, des bronches et du poumon (251 hommes et 73 femmes), soit un taux de 3,2 séjours pour 1 000 habitants (3,1 % dans l'Oise et 2,7 % en Picardie). Ce taux est plus élevé pour les hommes que pour les femmes : 5,6 % contre 1,3 %.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de séjours pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) (hommes+femmes) | Taux de séjours pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) pour 1 000 habitants (hommes +femmes) |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 26 | 3,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 77 | 5,5 |
| CC Canton d'Attichy | 46 | 3,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 175 | 2,8 |
| Compiégnois | 324 | 3,2 |
| Oise | 2 156 | 3,1 |
| Picardie | 4 802 | 2,7 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — **3,9**

Les **causes liées au tabac** (cancer de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives) ont généré 137 décès en moyenne par an entre 2000 et 2005 dans le Compiégnois, soit un taux de mortalité de 149,9 pour 100 000. Ce taux est plus faible que ceux de l'Oise (152,4) et de la Picardie (156,4) et significativement plus élevé qu'en France métropolitaine (134,8). Cela touche trois fois plus les hommes que les femmes : 255,6 pour 100 000 chez les hommes du Compiégnois (91 décès annuels) et 78,0 pour 100 000 chez les femmes (45 décès annuels).

Parmi ces causes, 49 décès en moyenne par an (40 hommes et 9 femmes) sont dûs au cancer de la trachée, des bronches et du poumon, ce qui représente un taux de mortalité de **52,0 pour 100 000 en 2000-2005 dans le Compiégnois**. Ce taux est supérieur aux taux départemental (49,3), régional (50,2) et national (44,3 ; différence significative). Le taux de mortalité est cinq fois plus important chez les hommes du Compiégnois que chez les femmes (98,3 contre 17,4 pour 100 000).

Les **bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives** sont la cause en moyenne de 21 décès par an d'habitants du Compiégnois (13 hommes et 8 femmes) entre 2000 et 2005. Le taux de mortalité correspondant pour cette maladie est de 23,7 pour 100 000 dans le Compiégnois (43,2 pour les hommes et 13,1 pour les femmes) contre 22,8 dans l'Oise, 21,5 en Picardie et 17,3 en France métropolitaine (différence significative).

Enfin, la mortalité par cardiopathies ischémiques (cf. page 24) n'est pas significativement différente du niveau national.


Données par EPCI

| | Nombre annuel moyen de décès par maladies liées au tabac en 2000-2005 | | | Taux de mortalité pour maladies liées au tabac (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|---|--------|----------|--|--------------|--------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 4 | 8 | 12 | 79,4 | 282,5 | 162,4 |
| CC Plaine d'Estrées | 6 | 11 | 16 | 83,8 | 202,4 | 139,4 |
| CC Canton d'Attichy | 8 | 18 | 26 | 89,4 | 328,7 | 186,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 28 | 55 | 83 | 74,2 | 246,0 | 142,4 |
| Compiégnois | 45 | 91 | 137 | 78,0 | 255,6 | 149,9 |
| Oise | 303 | 600 | 902 | 84,0 | 246,5 | 152,4 |
| Picardie | 840 | 1 680 | 2 520 | 84,3 | 258,0 | 156,4 |
| France métropolitaine | 27 572 | 51 389 | 78 961 | 73,5 | 222,4 | 134,8 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — **86,0** — **274,5** — **165,3**

NB : Les causes liées au tabac comprennent les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, les cardiopathies ischémiques, les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives.



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de décès pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon en 2000-2005 | | | Taux de mortalité pour cancer de la trachée, des bronches et du poumon (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|--------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 1 | 4 | 5 | 22,4 | 128,4 | 65,3 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 4 | 5 | 9,1 | 70,3 | 36,8 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 7 | 8 | 14,0 | 100,8 | 53,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 7 | 25 | 32 | 19,4 | 100,5 | 53,4 |
| Compiégnois | 9 | 40 | 49 | 17,4 | 98,3 | 52,0 |
| Oise | 55 | 262 | 317 | 15,4 | 93,4 | 49,3 |
| Picardie | 136 | 716 | 851 | 14,4 | 96,3 | 50,2 |
| France métropolitaine | 5 025 | 21 020 | 26 045 | 15,2 | 82,3 | 44,3 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — **14,3** — **95,3** — **50,1**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif. Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

| | Nombre annuel moyen de décès par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives en 2000-2005 | | | Taux de mortalité pour bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (pour 100 000 habitants) en 2000-2005 | | |
|-------------------------|--|--------|----------|---|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 0* | 1 | 1 | 6,8 | 36,7 | 18,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 1 | 2 | 12,5 | 24,8 | 17,4 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 3 | 4 | 12,4 | 55,7 | 28,1 |
| Secteur CA de Compiègne | 5 | 9 | 14 | 14,0 | 44,6 | 24,5 |
| Compiégnois | 8 | 13 | 21 | 13,1 | 43,2 | 23,7 |
| Oise | 45 | 83 | 128 | 12,6 | 40,3 | 22,8 |
| Picardie | 114 | 221 | 336 | 11,5 | 39,3 | 21,5 |
| France métropolitaine | 3 612 | 6 491 | 10 103 | 9,5 | 31,1 | 17,3 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne — **11,2** — **41,2** — **22,4**

* Pour cet EPCI, on compte 2 décès entre 2000 et 2005 donc moins de 1 décès par an

Affections psychiatriques

Affections de longue durée

Le Compiégnois a un taux de nouvelles admissions en ALD pour **affection psychiatrique de longue durée de 127,2 pour 100 000** en 2004-2005 (135 personnes en moyenne annuelle), ce qui est significativement inférieur au taux national (169,8 ; 139,6 dans le département et 131,9 en région).

La **maladie d'Alzheimer et autres démences** représentent un taux de nouvelles admissions de 314,6 pour 100 000 habitants âgés de 50 ans ou plus dans le Compiégnois en 2004-2005, soit 93 personnes en moyenne annuelle. Ce taux est plus élevé que ceux de l'Oise (268,8), de la Picardie (262,6) et de la France métropolitaine (252,5 ; différence significative). Ce taux est également significatif sur la communauté d'agglomération de Compiègne.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour affections psychiatriques de longue durée en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour affections psychiatriques de longue durée (pour 100 000 habitants) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 14 | 140,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 11 | 67,8 |
| CC Canton d'Attichy | 17 | 109,9 |
| Secteur CA de Compiègne | 94 | 147,5 |
| Compiégnois | 135 | 127,2 |
| Oise | 1 053 | 139,6 |
| Picardie | 2 397 | 131,9 |
| France métropolitaine | 99 822 | 169,8 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **101,7**

| | Nombre annuel moyen de nouvelles admissions pour maladie d'Alzheimer et autres démences en 2004-2005 (hommes+femmes) | Taux de nouvelles admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer et autres démences (pour 100 000 habitants âgés de 50 ans et plus) en 2004-2005 (hommes+femmes) |
|-------------------------|--|--|
| CC Basse Automne | 5 | 208,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 8 | 240,5 |
| CC Canton d'Attichy | 14 | 327,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 66 | 338,2 |
| Compiégnois | 93 | 314,6 |
| Oise | 498 | 268,8 |
| Picardie | 1 378 | 262,6 |
| France métropolitaine | 50 199 | 252,5 |

Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **272,2**

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.


Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Séjours hospitaliers

En 2004-2005, 694 séjours en hôpital d'habitants du Compiégnois en moyenne par an ont eu comme diagnostics principal et relié des troubles mentaux et comportementaux (207 concernant des hommes et 399 des femmes). Ces séjours correspondent à un taux de 6,3 séjours pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (7,9 ‰) et de la Picardie (6,5 ‰).

Le taux de séjours pour troubles mentaux et comportementaux des hommes du Compiégnois est moins élevé que celui des femmes : 5,5 séjours pour 1 000 hommes du Compiégnois contre 6,7 ‰ chez les femmes.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de séjours pour troubles mentaux et comportementaux en 2004-2005 (diagnostics principal et relié) | | | Taux de séjours pour troubles mentaux et comportementaux en 2004-2005 (diagnostics principal et relié), pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|---|--------|----------|--|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 37 | 22 | 59 | 7,9 | 4,9 | 6,5 |
| CC Plaine d'Estrées | 30 | 35 | 65 | 3,7 | 4,6 | 4,1 |
| CC Canton d'Attichy | 27 | 31 | 59 | 3,2 | 4,1 | 3,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 305 | 207 | 511 | 8,0 | 6,1 | 7,4 |
| Compiégnois | 399 | 295 | 694 | 6,7 | 5,5 | 6,3 |
| Oise | 2 844 | 2 792 | 5 636 | 7,4 | 8,2 | 7,9 |
| Picardie | 5 991 | 5 937 | 11 927 | 6,1 | 6,9 | 6,5 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **4,5** ————— **4,4** ————— **4,5**

Mortalité

Le taux de mortalité pour la maladie d'Alzheimer situe le pays au niveau de la France métropolitaine (53,8 décès pour 100 000 habitants de 50 ans et plus en 2000-2005 *versus* 55,3), de l'ensemble du département (55,9) et de la région (58,3). Toutefois cette approche globale masque une réalité locale plus contrastée. En effet, les trois communautés de communes (38,1 décès pour 100 000 habitants de 50 ans et plus en 2000-2005) présentent une sous-mortalité en regard de la moyenne nationale. Bien qu'un peu supérieure au niveau nationale, la valeur pour ce taux de mortalité de la communauté d'agglomération de Compiègne ne la situe pas de façon différente à la moyenne nationale. Le pays compte 130 lits en maison de retraite dédiés aux personnes présentant une maladie d'Alzheimer, dont 97 dans la seule ville de Compiègne.

Consommation de psychotropes

En 2006, 21,6 % des assurés sociaux ont été remboursés au moins une fois pour un psychotrope (26,7 % des femmes et 15,9 % des hommes), soit 18 026 personnes. Cette proportion est proche de l'Oise (22,1 %) et plus faible qu'en Picardie (24,1 %).

Les **anxiolytiques** sont la classe de psychotropes la plus remboursée. Ces médicaments sont surtout prescrits pour l'anxiété, mais certains le sont aussi pour des cas d'épilepsie du fait de leurs autres propriétés. Pour cette classe, la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006 est de 14,5 % des assurés du Compiégnois, ce qui est moins élevé que dans l'Oise (15,0 %) et qu'en Picardie (16,4 %). Ces anxiolytiques concerne 18,5 % des femmes et 9,8 % des hommes du Compiégnois, soit 12 148 personnes remboursées en 2006.

La consommation d'**antidépresseurs** dans le Compiégnois est intermédiaire (8,0 %) à celles du département (7,7 %) et de la région (8,3 %). En tout, ce sont 6 730 personnes du pays qui ont eu au moins une fois dans l'année un remboursement pour un antidépresseur en 2006 (10,7 % des femmes et 5,0 % des hommes).

La consommation de **neuroleptiques** concerne 1,5 % des assurés du Compiégnois, ce qui est équivalent à l'Oise (1,5 %) et à la Picardie (1,6 %). Ceci correspond à 1 256 assurés sociaux du Compiégnois en 2006 (1,6 % des femmes et 1,4 % des hommes).

La consommation de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), encore une fois évaluée par la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006, concerne 0,22 % des assurés du Compiégnois (soit 192 personnes). Elle concerne 0,26 % des femmes et 0,19 % des hommes. Elle est équivalente aux taux du département (0,23 %) et de la région (0,22 %).

Les **traitements de substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) concernent 0,29 % de la population du Compiégnois, ce qui est proche des taux du département (0,24 %) et de la région (0,30 %). Elle est de 0,12 % chez les femmes et de 0,45 % chez les hommes, soit 272 personnes.

Le **traitement médicamenteux de la dépendance alcoolique** a été remboursée à 0,29 % des assurés (0,15 % des femmes et 0,43 % des hommes), soit 259 personnes du Compiégnois en 2006. Cette proportion est de 0,35 % dans l'Oise et de 0,38 % en Picardie.

Note : tous les chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment). Ces données proviennent de la base de l'Urcam.

Causes externes

Séjours hospitaliers

Note : contrairement aux autres causes d'hospitalisation qui sont en diagnostics principaux et reliés, les données des accidents de circulation et des tentatives de suicide sont en diagnostics associés significatifs (Das). Par exemple, le diagnostic principal peut être une fracture de la jambe et le diagnostic associé, l'accident de circulation. Les accidents et les suicides ne sont jamais codés en diagnostic principal.

En 2004-2005, 27 séjours annuels pour un **accident de la circulation** ont été recensés pour des habitants du Compiégnois (9 pour les femmes et 18 pour les hommes). Le taux est de 0,2 séjour pour 1 000 habitants (0,1 ‰ pour les femmes et 0,3 ‰ pour les hommes), contre 0,6 ‰ pour l'Oise et la Picardie.

Les **tentatives de suicide** ont entraîné annuellement 359 séjours hospitaliers d'habitants du Compiégnois en 2004-2005 (238 pour des femmes et 120 pour des hommes), soit un taux de **3,1 séjours pour 1 000 habitants** (2,9 ‰ dans le département et en région).


Données par EPCI

| | Nombre annuel moyen de séjours pour accident de transport en 2004-2005 (diagnostic associé) | | | Taux de séjours pour accident de transport en 2004-2005 (diagnostic associé) pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|---|--------|----------|---|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 4 | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 7 | 12 | 19 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Compiégnois | 9 | 18 | 27 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Oise | 167 | 324 | 491 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
| Picardie | 362 | 755 | 1 118 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 0,1 ————— 0,3 ————— 0,2



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre annuel moyen de séjours pour tentative de suicide en 2004-2005 (diagnostic associé) | | | Taux de séjours pour tentative de suicide en 2004-2005 (diagnostic associé) pour 1 000 habitants | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--|--------|----------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 23 | 11 | 34 | 4,6 | 2,1 | 3,4 |
| CC Plaine d'Estrées | 24 | 8 | 33 | 2,9 | 1,0 | 2,0 |
| CC Canton d'Attichy | 30 | 14 | 45 | 3,7 | 1,8 | 2,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 160 | 87 | 247 | 4,3 | 2,4 | 3,4 |
| Compiégnois | 238 | 120 | 359 | 4,1 | 2,1 | 3,1 |
| Oise | 1 540 | 776 | 2 316 | 3,8 | 2,0 | 2,9 |
| Picardie | 3 550 | 1 917 | 5 467 | 3,7 | 2,0 | 2,9 |

Sources : Atih, Insee, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 3,6 ————— 1,6 ————— 2,6

Données de la sécurité routière

D'après l'observatoire régional de la sécurité routière de Picardie, 249 accidents de la circulation sont survenus entre 2000 et 2005 dans le Compiégnois* (42 en moyenne annuelle). Parmi eux, 127 ont entraîné au moins un mort ou un blessé hospitalisé (21 en moyenne annuelle).


On compte 51 décès pour cette période (soit 9 décès en moyenne annuelle), 107 blessés graves (18 en moyenne annuelle) et 274 blessés légers (46 en moyenne annuelle).

* Cela concerne les accidents survenus dans le pays du Compiégnois, quel que soit le domicile de la personne accidentée.

La consommation d'alcool peut être appréhendée par les effets néfastes induits. L'une des conséquences d'une consommation excessive d'alcool est l'accident de voiture.


Sur 87 accidents de la circulation survenus en 2005, 14 conducteurs avaient une alcoolémie supérieure à **0,5 gramme d'alcool**, soit **16,1 % des accidents**. Ce pourcentage est supérieur à l'Oise (12,4 %) et à la Picardie (13,5 %).

Proportion d'accidents de la circulation survenus dans le Compiégnois dont une personne a un test d'alcoolémie retrouvé positif en 2005 (en %)



Source : Observatoire régional de la sécurité routière
* min : Grand Amiénois ; ** max : Thiérache

Proportion d'accidents de la circulation survenus dans le Compiégnois selon qu'ils sont le fait de personnes habitant dans l'Oise ou non, en 2000-2005 (en %)



Source : Observatoire régional de la sécurité routière

Le pourcentage d'accidents impliquant une voiture immatriculée dans le département est de 40,2 %, soit 96 accidents sur l'ensemble de la période 2000-2005.

Les véhicules ayant eu un accident entre 2000 et 2005 provenant d'un autre département, voire immatriculés dans un pays étranger représentent respectivement 40,6 % et 19,2 % des accidents (respectivement 97 et 46 véhicules sur l'ensemble de la période).

Les données de l'observatoire régional de la sécurité routière proviennent du fichier national brut issu des bulletins d'analyse des accidents corporels transmis par le Sétra (Service d'études techniques des routes et autoroutes). Ces données sont ensuite corrigées par les observatoires départementaux avant d'être transmises à l'observatoire régional.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les tués sont les personnes décédées dans les six jours suivant l'accident ; les blessés graves sont les personnes ayant nécessité plus de six jours d'hospitalisation ; les blessés légers sont les personnes ayant nécessité moins de six jours d'hospitalisation. Le 1^{er} janvier 2005, afin de comparer ces résultats à ceux de ses voisins européens, la France a adopté la définition internationale. Depuis cette date, les périodes passent à 30 jours pour les tués, à plus de 24 heures d'hospitalisation pour les blessés graves et à moins de 24 heures d'hospitalisation pour les blessés légers.

Mortalité

En 2000-2005, les causes externes de mortalité ont entraîné en moyenne 67 décès par an dans le Compiégnois, soit un taux de 65,9 pour 100 000 (73,6 au niveau départemental et 78,0 au niveau régional).

Ce taux n'est pas significativement différent du taux national (67,0) et constitue le deuxième taux le plus bas des pays picards (après le Sud de l'Oise).

Parmi ces causes externes de mortalité, les **accidents de circulation ont un taux de mortalité de 11,4 pour 100 000** dans le Compiégnois (13 décès en moyenne annuelle) contre 13,7 dans l'Oise, 13,4 en Picardie et 10,4 en France métropolitaine (différence non significative). À noter que la surmortalité n'est significative que sur les trois communautés de communes regroupées, liée aux mortalités élevées des communautés de communes Basse Automne et canton d'Attichy.

La **mortalité par suicide** dans le Compiégnois (**16,2 pour 100 000** ; 19,8 dans l'Oise et 22,7 en Picardie) n'est également pas significativement différente du taux de la France métropolitaine (17,9). On compte 17 suicides en moyenne par an dans le Compiégnois.


Les personnes de 65 ans et plus représentent 26,9 % des décès par suicide du Compiégnois, contre 25,4 % dans l'Oise, 26,6 % en Picardie et 28,2 % en France métropolitaine.

Les 15-24 ans représentent 5,8 % des suicides du Compiégnois en 2000-2005, contre 5,3 % dans le département, 5,1 % dans la région et 5,6 % au niveau national.

Les accidents de la circulation comme les suicides concernent davantage les hommes que les femmes. Ainsi, le taux de mortalité par accident de la circulation dans le Compiégnois est de 16,2 pour 100 000 chez les hommes (20,9 dans l'Oise, 20,8 en Picardie et 16,1 en France métropolitaine) contre 7,1 pour les femmes (respectivement 6,8, 6,3 et 5,2).


De même, les taux de mortalité par suicide sont de 26,7 pour 100 000 pour les hommes du Compiégnois (31,9 dans le département, 37,6 en région et 28,7 au niveau national) contre 8,4 pour les femmes (respectivement 9,9, 10,4 et 9,1).

Taux standardisé de mortalité par causes externes en 2000-2005 (pour 100 000 habitants)



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S
* min : Sud de l'Oise ; ** max : Trait Vert - Santerre Initiatives

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre moyen annuel de décès en 2000-2005 (hommes+femmes) | | Taux pour 100 000 habitants en 2000-2005 (hommes+femmes) | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Mortalité par accident de la circulation | Mortalité par suicide | Mortalité par accident de la circulation | Mortalité par suicide |
| CC Basse Automne | 2 | 2 | 21,7 | 18,8 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 | 3 | 9,6 | 17,4 |
| CC Canton d'Attichy | 3 | 1 | 19,4 | 9,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 6 | 12 | 8,8 | 17,6 |
| Compiégnois | 13 | 17 | 11,4 | 16,2 |
| Oise | 105 | 144 | 13,7 | 19,8 |
| Picardie | 249 | 408 | 13,4 | 22,7 |
| France métropolitaine | 6 251 | 10 689 | 10,4 | 17,9 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S Exploitation OR2S
Total EPCI hors CA de Compiègne — 16,2 — 14,7

Les taux dont la différence avec le niveau national est significative sont mis en gras (rouge, si supérieurs et vert, si inférieurs). La significativité prend en compte la taille des populations, ce qui explique que certaines unités géographiques peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux sont plus élevés que ceux d'autres unités géographiques qui enregistrent pourtant un test significatif.

Compte tenu des arrondis, les sommes des nombres peuvent être légèrement différentes.

Ces décès sont différents de ceux présentés par l'observatoire de la sécurité routière car les décès présentés dans le tableau ci-dessus sont domiciliés et ont donc pu survenir dans l'ensemble de la France, voire dans un pays étranger. À l'inverse, les décès de personnes non domiciliées dans le Compiégnois mais étant survenus dans ce pays ne sont pas comptabilisés dans ce tableau.

Autres causes

Entre 1991 et 2004, la **grippe** a été la cause de 16 décès d'habitants du Compiégnois, ce qui correspond à un taux brut de mortalité de 1,0 pour 100 000 habitants (0,7 dans l'Oise, 1,0 en Picardie et 1,4 en France métropolitaine).

Sur la même période, la **tuberculose** a entraîné 13 décès dans le Compiégnois, soit un taux brut de mortalité de 0,8 pour 100 000 (0,7 dans le département, 0,9 en région et 1,2 au niveau national).

Enfin, le taux brut de mortalité par sida est de 3,5 pour 100 000 habitants du Compiégnois (2,3 dans l'Oise, 1,7 en Picardie et 4,1 en France métropolitaine), soit 54 personnes qui sont décédées entre 1991 et 2004.

Vaccinations

Grippe*

En 2006, 7 115 habitants du Compiégnois du régime général âgés de **65 ans et plus** ont été **vaccinés contre la grippe**, soit un taux de 62,3 % des assurés sociaux du régime général (62,3 % dans l'Oise et 64,9 % en Picardie).

Les hommes de 65 ans et plus sont davantage vaccinés que les femmes avec un taux de 63,7 % (2 894 hommes) contre 61,3 % des femmes de cette même tranche d'âge (4 221 femmes). Les taux sont de 62,6 % dans le département et de 66,1 % en région pour les hommes et de 62,2 % et 64,2 % pour les femmes.

Chez les **personnes en ALD** âgées de moins de 65 ans, le taux de vaccination contre la grippe dans le Compiégnois est de **40,7 %** (soit 813 personnes), contre 41,1 % dans l'Oise et 46,7 % en Picardie.

Ces taux sont plus élevés chez les hommes (485 vaccinés) que chez les femmes (328 vaccinées) du Compiégnois : 42,0 % pour les premiers (40,6 % dans l'Oise et 46,1 % en Picardie) et 39,0 % pour les dernières (41,8 % dans le département et 47,6 % en région).

* Données issues du système d'information de l'Assurance maladie (Erasmé), exploitées par l'Urcam.

Données par EPCI



0 15 30 km

- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Pourcentage de personnes de 65 ans et plus prises en charge dans le régime général et vaccinées contre la grippe en 2006 | | | Pourcentage de personnes en ALD de moins de 65 ans prises en charge dans le régime général et vaccinées contre la grippe en 2006 | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Ensemble | Femmes | Hommes | Ensemble |
| CC Basse Automne | 58,5 | 62,8 | 60,2 | 34,1 | 38,5 | 36,6 |
| CC Plaine d'Estrées | 65,2 | 68,7 | 66,7 | 44,7 | 44,6 | 44,6 |
| CC Canton d'Attichy | 67,0 | 66,9 | 66,9 | 55,1 | 46,6 | 50,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 60,0 | 62,1 | 60,8 | 35,7 | 41,0 | 38,6 |
| Compiégnois | 61,3 | 63,7 | 62,3 | 39,0 | 42,0 | 40,7 |
| Oise | 62,2 | 62,6 | 62,3 | 41,8 | 40,6 | 41,1 |
| Picardie | 64,2 | 66,1 | 64,9 | 47,6 | 46,1 | 46,7 |

Source : Urcam Picardie - Erasmé

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne **64,3** **66,6** **65,2** **45,5** **43,7** **44,4**

Vaccinations infantiles**

En 2006, sur les 1 006 certificats de santé du 24^e mois du Compiégnois, 91,9 % des enfants de deux ans sont **vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole**, contre 91,3 % dans l'Oise et 89,3 % en Picardie.

Concernant le BCG, le taux de vaccination en 2006 est de **85,5 %** dans le Compiégnois contre 87,4 % dans le département et 84,6 % en région.

Le taux de vaccination contre la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite** est de **93,0 %** dans le pays en 2006, ce qui est supérieur à l'Oise (91,7 %) et à la Picardie (91,3 %).

Enfin, cette même année, la vaccination contre l'**hépatite B** est moins pratiquée que les vaccins précédents avec un taux de **55,1 %** contre 51,5 % dans l'Oise et 52,7 % en Picardie.

** Données des services de protection maternelle infantile (PMI) des conseils généraux.


Chapitre 3. Offre de soins et de services

Professionnels de santé

Médecins généralistes


Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 85,7 % des habitants du Compiégnois ayant consulté un généraliste l'ont fait dans le pays même. Moins de 7 % sont allés ailleurs dans l'Oise (6,3 % dont 2,2 % à Ribécourt-Dreslincourt), 1,3 % sont allés dans l'Aisne, 0,4 % dans la Somme et 6,3 % dans le reste de la France (dont 0,6 % à Paris).

Répartition des médecins généralistes au 15 septembre 2009 dans le pays de Compiégnois et les communes limitrophes du pays



Sources : Adeli, Urcam, OR2S
Exploitation OR2S
Les données pour les communes hors Compiégnois sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008.
Pour situer le Compiégnois par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.
Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Densité de médecins généralistes au 15 septembre 2009 (pour 10 000 habitants)




Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006
Exploitation OR2S

* min : Thelle Vexin-Sablons ; ** max : Grand Amiénois
Les données pour le min et le max sont au 30 novembre 2006. Celles pour l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2008.

Au 15 septembre 2009, le Compiégnois compte 122 médecins généralistes libéraux et mixtes, soit une densité de 10,7 médecins pour 10 000 habitants. Cette densité est supérieure à celles de l'Oise (8,6) et de la Picardie (9,6) et proche de la France métropolitaine (11,1).

Parmi ces médecins, 34,4 % sont des femmes, ce qui est plus important que dans le département, qu'en région et qu'au niveau national (respectivement 30,5 %, 27,6 % et 29,4 %).

Répartition des médecins généralistes par classes d'âge au 15 septembre 2009 (en %)




L'âge moyen des médecins généralistes du Compiègnais est de 51,0 ans. Ils sont en moyenne plus âgés que les médecins de l'Oise (49,6 ans), de Picardie (49,4 ans) et de France métropolitaine (49,8 ans) et sont plus nombreux à avoir 55 ans et plus (36,4 % contre respectivement 31,6 %, 31,5 % et 32,3 %).

Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Les données pour l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 30 novembre 2006.

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de médecins généralistes (libéraux et mixtes) au 15/09/2009 | Densité de médecins généralistes (libéraux et mixtes) au 15/09/2009 pour 10 000 habitants |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 13 | 13,2 |
| CC Plaine d'Estrées | 12 | 7,4 |
| CC Canton d'Attichy | 10 | 6,1 |
| Secteur CA de Compiègne | 88 | 12,2 |
| Compiègnais | 122 | 10,7 |
| Oise | 678 | 8,6 |
| Picardie | 1 818 | 9,6 |
| France métropolitaine | 68 313 | 11,1 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 9,2

Les données pour l'Oise et la Picardie sont au 30 novembre 2006 et celles pour la France métropolitaine, au 1^{er} janvier 2008.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.

Médecins spécialistes

Les médecins spécialistes libéraux et mixtes sont 113 dans le Compiégnais, soit une densité de 9,9 spécialistes pour 10 000 habitants au 15 septembre 2009. Cette densité est plus élevée que dans l'Oise (5,1), qu'en Picardie (5,1) et qu'en France métropolitaine (8,8).

Ces spécialistes comptent **68 professionnels de spécialités médicales** : 2 en anatomie et cytologie pathologique, 5 en anesthésie réanimation, 8 en cardiologie, 6 en dermatologie et vénéréologie, 4 en gynécologie médicale, 5 en gastro-entérologie hépatologie, 2 en médecine interne, 2 en médecine nucléaire, 1 en néphrologie, 2 en neurologie, 8 en pédiatrie, 3 en pneumologie, 12 en radio-diagnostic et imagerie médicale, 5 en rhumatologie et 3 en radiothérapie.

Les **spécialités chirurgicales comptent 33 professionnels** : 3 en chirurgie générale, 1 en chirurgie plastique et reconstructrice, 1 en chirurgie thoracique et cardiaque, 7 en gynécologie obstétrique, 1 en hématologie, 8 en ophtalmologie, 4 en oto-rhino laryngologie, 2 en chirurgie maxillo-faciale stomatologie, 1 en chirurgie urologique, 2 en chirurgie orthopédique et traumatologique, 1 en chirurgie vasculaire, 1 en chirurgie viscérale et 1 en stomatologie.

Enfin, **2 médecins en biologie médicale et 10 psychiatres** (8 en psychiatrie et 2 en psychiatrie pour enfants et adolescents) exercent également dans le pays du Compiégnais.


Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 89,6 % des consultations de dermatologues suivies par des habitants du Compiégnais se sont déroulées au sein même du pays, 5,8 % dans le reste du département de l'Oise, 1,0 % dans l'Aisne, 0,3 % dans la Somme, 2,2 % en Île-de-France (dont 1,3 % à Paris) et 1,3 % dans le reste de la France.

Les consultations d'ophtalmologues pour les habitants du pays ont eu lieu pour 86,6 % d'entre elles dans le Compiégnais, pour 5,1 % dans le reste de l'Oise (2,5 % à Senlis) pour 2,2 % dans l'Aisne, pour 0,7 % dans la Somme, pour 4,3 % en Île-de-France (dont 2,5 % à Paris) et pour 1,1 % dans le reste de la France.

Pour la gynécologie obstétrique, 84,5 % des consultations de patientes habitant le Compiégnais se sont déroulées dans le Compiégnais, 7,7 % ont eu lieu dans le reste du département de l'Oise (dont 3,9 % à Senlis), 0,9 % dans l'Aisne, 0,8 % dans la Somme, 5,0 % en Île-de-France (dont 2,5 % à Paris) et 1,2 % dans les autres départements français.

Enfin, pour la gynécologie médicale, 92,2 % des consultations ont eu lieu dans le pays du Compiégnais. Par ailleurs, 2,7 % des femmes du Compiégnais sont allées dans le reste du département, 1,3 % dans l'Aisne, 0,3 % dans la Somme, 2,9 % en Île-de-France (dont 2,0 % à Paris) et 0,7 % ailleurs en France.

Répartition des médecins spécialistes (toutes spécialités confondues) dans le Compiégnais et les communes limitrophes du pays au 15 septembre 2009



Sources : Adeli, Urcam, OR2S


Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiégnais sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008.

Pour situer le Compiégnais par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Répartition des médecins spécialistes par classes d'âge au 15 septembre 2009 (en %)



Sources : Adeli, Urcam, OR2S


Exploitation OR2S

Les données pour l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 30 novembre 2006.

La moyenne d'âge des médecins spécialistes du Compiégnais est de 54,2 ans (la moyenne est de 52,8 ans dans l'Oise, de 52,0 ans en Picardie et de 52,0 ans en France métropolitaine) et 51,3 % d'entre eux ont 55 ans et plus. Seuls deux spécialistes du Compiégnais ont moins de 40 ans.

Parmi les médecins spécialistes, on compte 28 femmes, soit 24,8 % des effectifs. Cette proportion est inférieure à celles de l'Oise (29,4 %), de la Picardie (26,6 %) et de la France métropolitaine (32,7 %).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de médecins spécialistes (libéraux et mixtes) au 15/09/2009 | Densité de médecins spécialistes (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 15/09/2009 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 0 | 0,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 0,6 |
| CC Canton d'Attichy | 2 | 1,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 110 | 15,3 |
| Compiégnois | 113 | 9,9 |
| Oise | 405 | 5,1 |
| Picardie | 972 | 5,1 |
| France métropolitaine | 53 832 | 8,8 |


Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne : 0,7

Les données pour l'Oise et la Picardie sont au 30 novembre 2006 et celles de la France métropolitaine, au 1^{er} janvier 2008.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.

Répartition des médecins spécialistes médicaux dans le Compiégnois et les communes limitrophes du pays au 15 septembre 2009



Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S


Les données pour les communes hors Compiégnois sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008.

Pour situer le Compiégnois par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

NB : les spécialistes médicaux regroupent, entre autres, les spécialistes en anatomie et cytopathologie, anesthésie, cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, gynécologie médicale, médecine interne, médecine nucléaire, neurologie, pédiatrie, pneumologie, radiodiagnostic, radiothérapie, rééducation et rhumatologie.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Répartition des médecins spécialistes en chirurgie dans le Compiégnois et les communes limitrophes du pays au 15 septembre 2009



Sources : Adeli, Urcam, OR2S


Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiégnois sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008.

Pour situer le Compiégnois par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

NB : les spécialistes en chirurgie regroupent, entre autres, les spécialistes en chirurgie générale, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, gynécologie médicale et obstétrique (associées), gynécologie obstétrique (seule), ophtalmologie, oto-rhino laryngologie et en stomatologie.

**Répartition des médecins spécialistes en psychiatrie
dans le pays du Compiégnais et les communes limitrophes du pays
au 15 septembre 2009**




Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiégnais sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008. Pour situer le Compiégnais par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

**Répartition des médecins spécialistes en biologie médicale
dans le pays du Compiégnais et les communes limitrophes du pays
au 15 septembre 2009**



Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiégnais sont au 30 novembre 2006, à l'exception des communes du Clermontois - Plateau Picard qui sont au 1^{er} juillet 2008. Pour situer le Compiégnais par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

NB : les médecins spécialistes en biologie médicale procèdent aux analyses biologiques (sang, urine...), touchant particulièrement aux domaines de l'hémodiagnostic transfusion, de l'immunologie, de la pharmacologie clinique et toxicologie, de la biochimie, de la bactériologie virologie, de l'hématologie biologique, de la parasitologie.


Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Le Compiégnois a une **densité de chirurgiens dentistes de 5,7 pour 10 000 habitants** (65 chirurgiens dentistes au 31 décembre 2007), ce qui est plus élevé que dans l'Oise (3,8) et qu'en Picardie (3,8) et proche de la France métropolitaine (6,2). Cette densité est la plus élevée des pays picards.

Ils ont en moyenne 48,4 ans et 32,3 % ont 55 ans et plus. Ils sont en moyenne plus jeunes que leurs confrères du département, de la région (49,3 ans et 49,1 ans) et d'âge équivalent à leurs confrères du niveau national (47,8 ans).

Les femmes sont 16 parmi ces dentistes, soit 24,6 % de l'effectif contre 28,3 % dans le département, 28,8 % en région et 33,9 % au niveau national.


Répartition des chirurgiens dentistes dans le pays du Compiégnois et les communes limitrophes au 31 décembre 2007



Sources : Adeli, Urcam, OR2S Exploitation OR2S
Pour situer le Compiégnois par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de chirurgiens dentistes (libéraux et mixtes) au 31/12/2007 | Densité de chirurgiens dentistes (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 31/12/2007 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 4 | 4,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 6 | 3,7 |
| CC Canton d'Attichy | 6 | 3,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 49 | 6,8 |
| Compiégnois | 65 | 5,7 |
| Oise | 305 | 3,8 |
| Picardie | 719 | 3,8 |
| France métropolitaine | 37 292 | 6,2 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S Exploitation OR2S


Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 3,8

Les données pour l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2009.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.

Auxiliaires médicaux

Répartition des auxiliaires médicaux par classes d'âge au 30 avril 2007 (en %)



Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S


Au 30 avril 2007*, **186 auxiliaires médicaux** sont recensés dans le Compiègnais, soit une **densité de 16,3 pour 10 000 habitants**. Cette densité est supérieure à celles de l'Oise (11,7) et de la Picardie (13,7) et inférieure à celle de la France métropolitaine (21,7).

C'est une profession assez féminisée puisque les femmes représentent 74,2 % de l'effectif (69,8 % dans l'Oise, 71,0 % en Picardie et 69,0 % en France métropolitaine).

Les auxiliaires médicaux sont aussi âgés que dans les territoires de référence puisque leur moyenne d'âge est de 43,2 ans contre 43,5 ans dans l'Oise, 43,4 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine.

* Contrairement aux masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes pour lesquels une mise à jour a été effectuée, les données concernant les infirmières n'ont pu être pour la publication de ce document. Par conséquent, les chiffres concernant les auxiliaires médicaux pris dans leur ensemble sont en date du 30 avril 2007.

Répartition des masseurs kinésithérapeutes dans le pays du Compiègnais et les communes limitrophes du pays au 31 août 2009




Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiègnais sont au 30 décembre 2007. Pour situer le Compiègnais par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Répartition des orthophonistes dans le pays du Compiègnais et les communes limitrophes du pays au 31 août 2009




Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Les données pour les communes hors Compiègnais sont au 30 décembre 2007. Pour situer le Compiègnais par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
 2 : Secteur CA de Compiègne
 3 : CC Canton d'Attichy
 4 : CC Basse Automne

| | Nombre d'auxiliaires médicaux (libéraux et mixtes) au 30/04/2007 | Densité d'auxiliaires médicaux (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 30/04/2007 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 11 | 11,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 25 | 15,4 |
| CC Canton d'Attichy | 24 | 14,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 131 | 18,2 |
| Compiégnois | 186 | 16,3 |
| Oise | 930 | 11,7 |
| Picardie | 2 595 | 13,7 |
| France métropolitaine | 133 142 | 21,7 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 14,1

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.

| | Nombre de masseurs kinésithérapeutes (libéraux et mixtes) au 31/08/2009 | Densité de masseurs kinésithérapeutes (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 31/08/2009 |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 5 | 5,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 9 | 5,5 |
| CC Canton d'Attichy | 7 | 4,3 |
| Secteur CA de Compiègne | 54 | 7,5 |
| Compiégnois | 75 | 6,6 |
| Oise | 360 | 4,5 |
| Picardie | 958 | 5,1 |
| France métropolitaine | 52 804 | 8,6 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 4,9

Les données concernant l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2009.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.

| | Nombre d'orthophonistes (libéraux et mixtes) au 31/08/2009 | Densité d'orthophonistes (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 31/08/2009 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 3 | 3,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 2 | 1,2 |
| CC Canton d'Attichy | 4 | 2,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 20 | 2,8 |
| Compiégnois | 29 | 2,5 |
| Oise | 115 | 1,5 |
| Picardie | 288 | 1,5 |
| France métropolitaine | 14 744 | 2,4 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 2,1

Les données concernant l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2009.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.


Infirmiers

Les infirmiers exerçant dans le Compiégnois sont 81 au 30 avril 2007, soit une **densité de 7,1 pour 10 000 habitants** (5,4 dans l'Oise, 7,1 en Picardie et 11,1 en France métropolitaine).

La moyenne d'âge des infirmiers du Compiégnois est de 42,5 ans (44,1 ans dans le département, 44,6 ans en région et 44,9 ans au niveau national) et seuls 11,1 % d'entre eux ont 55 ans et plus.

La profession est fortement féminisée : 93,8 % de femmes parmi les infirmiers du pays (87,9 % dans l'Oise, 88,5 % en Picardie et 84,6 % en France métropolitaine).

Répartition des infirmiers dans le pays du Compiégnois et les communes limitrophes du pays au 30 avril 2007




Sources : Adeli, Urcam, OR2S

Exploitation OR2S

Pour situer le Compiégnois par rapport aux territoires limitrophes, se reporter à la carte page 58.

Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre d'infirmiers (libéraux et mixtes) au 30/04/2007 | Densité d'infirmiers (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants au 30/04/2007 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 4 | 4,1 |
| CC Plaine d'Estrées | 15 | 9,2 |
| CC Canton d'Attichy | 11 | 6,7 |
| Secteur CA de Compiègne | 53 | 7,4 |
| Compiégnois | 81 | 7,1 |
| Oise | 436 | 5,5 |
| Picardie | 1 453 | 7,7 |
| France métropolitaine | 73 510 | 12,0 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 7,1

Les données concernant l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2009.

Il est possible que la somme du nombre de professionnels de santé présents dans les EPCI ne soit pas égale au nombre indiqué pour le pays dans la mesure où les professionnels exerçant dans différents EPCI ont été comptés dans chaque EPCI, mais une seule fois au niveau du pays.


Au 15 juillet 2009, 38 officines sont implantées dans le Compiégnois, soit une densité de **3,3 pharmacies pour 10 000 habitants** (contre 2,9 dans l'Oise et 3,2 en Picardie).

À la même date, le pays du Compiégnois compte **quatre sages-femmes libérales**, soit une densité de 1,44 pour 10 000 femmes âgées de 15 à 49 ans (1,15 dans l'Oise, 0,83 en Picardie et 2,23 en France métropolitaine en date du 1^{er} janvier 2009).

Le Compiégnois compte **neuf laboratoires d'analyses médicales**, soit une densité de 0,8 laboratoire pour 10 000 habitants au 15 juillet 2009 (0,5 dans l'Oise et en Picardie).

Enfin, **cinq entreprises de transport en ambulance** sont implantées dans le Compiégnois, soit une densité de 0,4 entreprise pour 10 000 habitants. Cette densité est identique à celle du département (0,4) et inférieure à celle de la région (1,1).

Données par EPCI



- 1 : CC* Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA** de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

* CC : communauté de communes
 ** CA : communauté d'agglomération

| | Nombre de pharmacies au 15/07/2009 | Densité de pharmacies pour 10 000 habitants au 15/07/2009 |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| CC Basse Automne | 2 | 2,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 6 | 3,7 |
| CC Canton d'Attichy | 4 | 2,4 |
| Secteur CA de Compiègne | 26 | 3,6 |
| Compiégnois | 38 | 3,3 |
| Oise | 228 | 2,9 |
| Picardie | 612 | 3,2 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S
 Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 2,8

Les données pour l'Oise et la Picardie sont du 31 décembre 2006.

| | Nombre de laboratoires d'analyses médicales au 15/07/2009 | Densité de laboratoires d'analyses médicales pour 10 000 habitants au 15/07/2009 |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 2 | 2,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 0,6 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 0,6 |
| Secteur CA de Compiègne | 4 | 0,6 |
| Compiégnois | 8 | 0,7 |
| Oise | 40 | 0,5 |
| Picardie | 90 | 0,5 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S
 Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 0,9

Les données pour l'Oise et la Picardie sont au 30 septembre 2007.

| | Nombre d'entreprises de transport en ambulance au 30/09/2007 | Densité d'entreprises de transport en ambulance pour 10 000 habitants au 30/09/2007 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 0 | 0,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 0,6 |
| CC Canton d'Attichy | 3 | 1,8 |
| Secteur CA de Compiègne | 1 | 0,1 |
| Compiégnois | 5 | 0,4 |
| Oise | 30 | 0,4 |
| Picardie | 199 | 1,1 |

Sources : Adeli, Urcam, Insee recensement de la population 2006, OR2S
 Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— 0,9

Les données pour l'Oise et la Picardie sont au 30 septembre 2007.

Consommations de soins

En 2006, on compte 77,2 % de consommateurs dans la population du Compiégnois. Cette proportion est proche de celles de l'Oise (77,3 %) et de la Picardie (77,7 %).

Les dépenses moyennes remboursables par consommant sont de 991 € dans le Compiégnois, soit 37 € de plus que dans l'Oise (954 €) et 41 € de moins qu'en Picardie (1 032 €).

Les habitants du Compiégnois dépensent en moyenne 93 € en 2006 pour des consultations de généralistes, ce qui est plus faible qu'aux niveaux départemental (96 €) et régional (103 €). Concernant les visites à domicile de généralistes, les dépenses moyennes des habitants du pays sont identiques à celles des Isariens (17 €) et inférieures à celles des Picards (24 €).

Pour les dépenses en transport également, les habitants du Compiégnois ont des dépenses moins élevées que les entités de référence : 42 € contre 53 € dans l'Oise et 63 € en Picardie.

La consommation de médicaments est plus élevée dans le Compiégnois (466 € en 2006 par consommant) que dans l'Oise (447 €) alors qu'elle est moins élevée qu'en Picardie (488 €).

Enfin, les consultations de spécialistes (49 € en moyenne par consommant en 2006) et les dépenses moyennes remboursables d'actes dentaires (68 €) sont plus élevées dans le Compiégnois que dans l'Oise (44 € et 61 €) et qu'en Picardie (41 € et 61 €).

Données par EPCI

| | Montant moyen remboursable par consommant (en euros) en 2006 | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Total par consommant | Consultations de généralistes | Visites de généralistes | Consultations de spécialistes | Médicaments | Transport | Actes dentaires |
| CC Basse Automne | 973 € | 100 € | 15 € | 44 € | 455 € | 53 € | 63 € |
| CC Plaine d'Estrées | 1 009 € | 98 € | 16 € | 47 € | 472 € | 40 € | 67 € |
| CC Canton d'Attichy | 974 € | 75 € | 29 € | 46 € | 458 € | 42 € | 77 € |
| Secteur CA de Compiègne | 994 € | 95 € | 15 € | 52 € | 468 € | 41 € | 66 € |
| Compiégnois | 991 € | 93 € | 17 € | 49 € | 466 € | 42 € | 68 € |
| Oise | 954 € | 96 € | 17 € | 44 € | 447 € | 53 € | 61 € |
| Picardie | 1 032 € | 103 € | 24 € | 41 € | 488 € | 63 € | 61 € |

Sources : CPAM, MSA, RSI

Total EPCI hors CA de Compiègne 987 € — 90 € — 21 € — 46 € — 463 € — 44 € — 70 € Exploitation OR2S

Établissements de soins

Au 31 juillet 2007, on recense **7 établissements de soins** dans le Compiégnois globalisant **546 lits installés en médecine, chirurgie, obstétrique** (MCO). La densité de lits en MCO est alors de 4,8 lits pour 1 000 personnes, ce qui est plus élevé que dans l'Oise (3,1 %) et qu'en Picardie (3,7 %).


Le Compiégnois compte **53 lits en psychiatrie pour adultes**, soit une densité de 0,6 lit pour 1 000 personnes de 16 ans et plus, ce qui est sensiblement inférieur à l'Oise (2,1) et à la Picardie (1,9).

En **psychiatrie infanto-juvénile**, on compte 25 lits installés, soit une densité de 1,0 lit pour 1 000 enfants de moins de 16 ans. La densité est proche de celles de l'Oise (1,9) et de la Picardie (1,4).

Un établissement du Compiégnois a une **unité de soins de longue durée** (USLD) comprenant au total 120 lits, ce qui correspond à une densité de **15,5 lits pour 1 000 personnes de 75 ans et plus**. Cette densité est plus faible que celles de l'Oise (25,9) et de la Picardie (23,9).

Les services de **soins de suite et de réadaptation** sont présents dans trois établissements du Compiégnois. Les 120 lits installés représentent une densité de **1,0 lit pour 1 000 habitants**, soit un niveau proche des moyennes départementale (1,5) et régionale (1,5).

Densité de lits de courte durée au 31 juillet 2007 (pour 1 000 habitants)



Sources : Finess, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S

* min : Vallées Bresles et Yeres ; ** max : Grand Creillois

*** Pour cette valeur nationale au 1^{er} janvier 2007, la Picardie est à 3,6 % et l'Oise à 3,0 %.

Permanence des soins et des urgences

Pour analyser l'accès aux soins de la population, la permanence des médecins sur les secteurs de garde fait l'objet d'une attention particulière. Cette analyse vise à quantifier l'absence de prise en charge afin de permettre une incitation à la réalisation des gardes. Les pays et les secteurs de gardes se superposent, chaque pays ayant sa propre répartition.

Le Compiégnois regroupe sept secteurs de garde pour la permanence des soins : Pont-Sainte-Maxence, Verberie, Estrées-Saint-Denis, Clairoix, Ribécourt, Compiègne et Attichy.

Les principaux secteurs de garde sont ceux d'Attichy (un tiers des 61 communes du Compiégnois), d'Estrées-Saint-Denis (26,2 % des communes) et de Verberie (24,6 %). Les quatre autres secteurs de garde regroupent chacun moins de 5 % des communes du Compiégnois.


L'ensemble des secteurs de garde du Compiégnois ont des taux de fonctionnement inférieurs à 50 %, que ce soit avant ou après minuit, avec des taux particulièrement faibles.

Parmi les sept secteurs de garde du Compiégnois, trois ont vu leurs astreintes diminuer entre le second semestre 2006 et le second semestre 2007 (Attichy, Pont-Sainte-Maxence et Ribécourt), trois ont eu une augmentation de leurs astreintes (Clairoix, Compiègne, Estrées-Saint-Denis) et un secteur est resté stable (Verberie).

Les proportions de gardes les dimanches et jours fériés, varient de 14,8 % des gardes du second semestre 2007 (Attichy) à 100 % des gardes (Pont-Sainte-Maxence et Verberie).


La garde est définie comme réalisée lorsqu'un médecin généraliste accepte de prendre en charge le secteur à son cabinet ou en visites à domicile. Par ailleurs, il est important de préciser que les données peuvent changer rapidement sur un secteur de garde (d'une année à l'autre, voire même pendant la même année). Les données présentées sur cette page et la suivante ne concernent que le second semestre 2007 et les gardes payées (astreintes) par l'Assurance maladie (par conséquent, un médecin effectuant une garde mais ne se déclarant pas à l'Assurance maladie ne serait pas pris en compte dans ces chiffres). Le taux de fonctionnement est calculé en rapportant le nombre de nuits d'astreintes sur le nombre de nuits du semestre.

Répartition des communes selon le secteur de garde (en %) au second semestre 2007




Source : Drass

Taux de fonctionnement avant minuit, par secteur de garde (en %) au second semestre 2007



Source : Urcam

Taux de fonctionnement après minuit, par secteur de garde (en %) au second semestre 2007



Source : Urcam

Le secteur d'Attichy (principal secteur de garde du pays avec 20 communes du Compiégnois prises en charge) a un taux de fonctionnement de 28,3 % avant minuit au second semestre 2007 et de 20,7 % après minuit. Au total, ce sont 61 astreintes réalisées au second semestre 2007 (dont 9 gardes les dimanches et jours fériés).

Ce secteur enregistre une chute de plus de 50 % (-52,0 %) du nombre d'astreintes par rapport au second semestre 2006.

Le secteur d'Estrées-Saint-Denis comporte 16 communes, soit plus d'un quart (26,2 %) des communes du pays. Le taux de fonctionnement est de 46,2 % avant minuit et de 1,6 % après minuit. Ce secteur a vu son activité augmenter en un an de 10,6 % pour atteindre 115 gardes au second semestre 2007 (dont 28 les dimanches et jours fériés).

Le secteur de Verberie couvre 15 communes, soit 24,6 % des communes du pays. Il n'assure aucune permanence avant ni après minuit. L'ensemble de ses 25 gardes sont effectuées les dimanches et jours fériés (nombre stable entre le second semestre 2006 et le second semestre 2007).

Le secteur de Compiègne est sur 3 communes (4,9 % des communes du pays). Le taux de fonctionnement avant minuit est de 4,3 % et de seulement 0,5 % après minuit. Il totalise 28 astreintes au second semestre 2007, soit une hausse d'activité de 12 % par rapport au second semestre 2006. Parmi ces astreintes, 71,4 % sont réalisées les dimanches et jours fériés.


Clairoix regroupe 3 communes et un taux de permanence de 3,8 % avant minuit. Il n'assure aucune permanence après minuit. Les astreintes ont augmenté de 4,0 % entre le second semestre 2006 et le second semestre 2007 (26 astreintes, dont 19 les dimanches et jours fériés).

Le secteur de Ribécourt (3 communes du Compiégnois) a totalisé 59 astreintes au second semestre 2007 (dont 20 les dimanches et jours fériés), soit une diminution de 6,3 % par rapport au second semestre 2006. Ce secteur a un taux de permanence de 21,2 % avant minuit mais n'assure aucune permanence après minuit.

Enfin, le dernier secteur (Pont-Sainte-Maxence, une seule commune du Compiégnois) n'offre aucune permanence avant ni après minuit. Il totalise 17 astreintes au second semestre 2007, effectuées les dimanches et jours fériés, soit une diminution de 32,0 % de ses astreintes depuis le second semestre 2006.

Dépistages

Proportion de femmes de 50-74 ans dépistées en 2007-2008 dans le cadre de la campagne de dépistage organisé du cancer du sein (en %)



Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, InVS, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S


* min : Grand Creillois ; ** max : Grand Amiénois

Le **dépistage organisé du cancer du sein** est plutôt bien suivi dans le Compiégnois avec un taux de femmes de 50-74 ans dépistées de 50,0 % (soit 7 274 mammographies en 2006-2007) en regard de l'ensemble du département de l'Oise (46,5 %). Ce pourcentage se situe au niveau de la région (50,6 %) mais en retrait du niveau national (51,7 %). À noter que le dépistage individuel est aussi utilisé par de nombreuses femmes, notamment sur l'est du pays.

Entre le 1^{er} avril 2007 et le 31 mars 2009, 7 745 habitants du Compiégnois ont effectué un dépistage du cancer colorectal, soit un taux de dépistage de 30,1 %. Ce taux est supérieur à celui de l'Oise (27,7 %) et inférieur à celui de la Picardie (33,3 %).

En 2006, d'après les données de l'Urcam, **5 786 frottis** ont été réalisés sur des femmes de 25-64 ans habitant le Compiégnois, soit 23,4 % de femmes dépistées pour le cancer du col de l'utérus. Ce taux est inférieur à celui de l'Oise (24,2 %), mais supérieur à celui de la Picardie (20,8 %).

Données par EPCI



- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de mammographies réalisées auprès des femmes de 50-74 ans* en 2007-2008 | Taux de dépistage du cancer du sein (pour 100 femmes de 50-74 ans*) en 2007-2008 |
|-------------------------|--|--|
| CC Basse Automne | 524 | 43,0 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 107 | 54,8 |
| CC Canton d'Attichy | 1 030 | 49,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 4 613 | 50,0 |
| Compiégnois | 7 274 | 50,0 |
| Oise | 46 196 | 46,5 |
| Picardie | 126 327 | 50,6 |
| France entière | 4 470 737 | 51,7 |

Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, InVS, Insee recensement de la population 2006 Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **49,9**

* Dans le cadre de la campagne de dépistage organisé.

| | Nombre de frottis réalisés auprès des femmes de 25-64 ans en 2006 | Taux de frottis pour 100 femmes de 25-64 ans en 2006 |
|-------------------------|---|--|
| CC Basse Automne | 572 | 26,7 |
| CC Plaine d'Estrées | 937 | 25,9 |
| CC Canton d'Attichy | 834 | 23,2 |
| Secteur CA de Compiègne | 3 443 | 22,5 |
| Compiégnois | 5 786 | 23,4 |
| Oise | 41 417 | 24,2 |
| Picardie | 82 844 | 20,8 |

Source : Urcam

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **25,0**

| | Nombre de personnes de 50-74 ans dépistées pour le cancer colorectal entre le 1/04/2007 et le 31/03/2009 | Taux de dépistage du cancer colorectal (pour 100 personnes de 50-74 ans*) entre le 1/04/2007 et le 31/03/2009 |
|-------------------------|--|---|
| CC Basse Automne | 611 | 27,4 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 347 | 35,8 |
| CC Canton d'Attichy | 1 175 | 31,0 |
| Secteur CA de Compiègne | 4 612 | 29,0 |
| Compiégnois | 7 745 | 30,1 |
| Oise | 50 253 | 27,7 |
| Picardie | 145 876 | 33,3 |

Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne ————— **32,0**

* Dans le cadre de la campagne de dépistage organisé.

Aides aux personnes âgées

Au 31 juillet 2007, **17 services sociaux en faveur des personnes âgées** sont recensés dans le Compiégnois sur les 79 installés dans l'Oise. Ces services comprennent les aides ménagères, les services de portage de repas et les services de soins à domicile.

Données par EPCI



0 15 30 km

- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de services sociaux en faveur des personnes âgées au 31/07/2007 |
|-------------------------|--|
| CC Basse Automne | 2 |
| CC Plaine d'Estrées | 0 |
| CC Canton d'Attichy | 3 |
| Secteur CA de Compiègne | 12 |
| Compiégnois | 17 |
| Oise | 79 |
| Picardie | 364 |

Sources : Finess, OR2S

Exploitation OR2S

Maisons de retraite

Le Compiégnois compte **19 maisons de retraite et logements-foyers** au 31 août 2009, soit 16,3 % des maisons de retraite de l'Oise.

Au total, ce sont 1 015 lits qui sont installés dans les maisons de retraite du Compiégnois, soit une densité de 65,4 lits pour 1 000 personnes de 65 ans et plus au 31 août 2009. Cette densité est comprise entre celles de l'Oise (69,4 ‰) et de la Picardie (62,0 ‰).

Données par EPCI



0 15 30 km

- 1 : CC Plaine d'Estrées
- 2 : Secteur CA de Compiègne
- 3 : CC Canton d'Attichy
- 4 : CC Basse Automne

| | Nombre de maisons de retraites et logements-foyers au 31/08/2009 | Nombre de places offertes au 31/08/2009 | Nombre de places pour 1 000 personnes de 65 ans et plus au 31/08/2009 |
|-------------------------|--|---|---|
| CC Basse Automne | 1 | 28 | 22,6 |
| CC Plaine d'Estrées | 1 | 32 | 16,3 |
| CC Canton d'Attichy | 6 | 265 | 116,5 |
| Secteur CA de Compiègne | 11 | 690 | 68,7 |
| Compiégnois | 19 | 1 015 | 65,4 |
| Oise | 116 | 7 116 | 69,4 |
| Picardie | 264 | 17 515 | 62,0 |
| France métropolitaine | 9 472 | 609 345 | 59,7 |

Sources : Finess, Insee recensement de la population 2006

Exploitation OR2S

Total EPCI hors CA de Compiègne 59,6

Les données concernant la France métropolitaine sont au 1^{er} janvier 2007. Les données pour l'Oise et la Picardie sont au 31 juillet 2007.

► Chapitre 4. Structures de prévention

Réponses à l'enquête sur les structures de prévention en décembre 2007

| | Réponse | Pas de réponse | Total |
|-------------------------|---------|----------------|-------|
| CC Basse Automne | 0 | 0 | 0 |
| CC Plaine d'Estrées | 0 | 1 | 1 |
| CC Canton d'Attichy | 1 | 1 | 2 |
| Secteur CA de Compiègne | 17 | 14 | 31 |
| Total | 18 | 16 | 34 |

Sources : Annuaire des structures de prévention, Conseil régional, Ireps de Picardie

Les acteurs de prévention recensés

Trente-quatre structures localisées dans le pays du Compiégnois ont été recensées comme pouvant engager des actions de prévention. Vingt-quatre sont de forme associative, deux sont des centres de planification, une est un service d'une collectivité locale, deux sont des services d'un centre hospitalier dont un pôle de prévention et une est une Ucsa.

Les structures identifiées se localisent principalement dans la communauté d'agglomération de Compiègne (trente structures).

Les thématiques de prévention développées

Parmi les dix-huit structures qui ont répondu au questionnaire, quatorze interviennent en prévention primaire, neuf en prévention secondaire et dix en prévention tertiaire. Parmi elles, huit se déclarent sur les trois types de prévention et une agit à la fois en prévention secondaire et en prévention tertiaire.

Les principaux thèmes d'intervention sont les conduites addictives (cinq structures), le tabac (cinq) et l'alcool (cinq). La nutrition (cinq), les maladies cardio-vasculaires (quatre) et le diabète (quatre) viennent ensuite.

Les populations ciblées

Cinq structures travaillent avec des patients, deux avec des personnes âgées ou des populations en situation de handicap.

En ce qui concerne les milieux d'intervention, le milieu scolaire est cité par quatre structures. Quatre structures travaillent en milieu du travail et trois se déroulent en milieu rural.

Sept structures développent des actions en direction des adultes, cinq pour les 16-25 ans et neuf pour toutes les populations.

Les modes d'intervention utilisés fréquemment en matière de prévention

Les acteurs de prévention recensés interviennent en prévention par de l'animation (onze structures), de l'aide aux personnes (onze), de l'information (dix). La diffusion documentaire (huit) et la formation (six) sont plus marginales tout comme le sont la production d'outils (quatre) ou les conférences (quatre).

Les résultats exposés ci-dessus sont l'aboutissement d'une enquête réalisée par le Cres de Picardie fin 2007. Cette analyse ne revêt pas un caractère exhaustif. Elle est le fruit de l'exploitation des réponses ou des non-réponses apportées. La base de données des acteurs de prévention santé ainsi constituée sera actualisée régulièrement.

Toutes les structures recensées (adresse et caractéristiques) sont dans les annexes de ce document (pages 59 et 60).



Synthèse

SYNTHÈSE

En préalable, il faut mentionner que la situation est contrastée entre la communauté d'agglomération de Compiègne et les trois communautés de communes qui composent le pays du Compiégnois, notamment pour ce qui concerne certains aspects sociaux.

Points positifs



Le niveau social du pays est plus élevé que le niveau national avec notamment des revenus nets imposables moyens de 22 972 € (le revenu le plus haut se situe dans l'EPCI de la Plaine d'Estrées avec 23 530 €) contre 21 930 € en France métropolitaine. De même, les personnes âgées du Compiégnois ont reçu en moyenne mensuelle 663 € de pension vieillesse en 2007, soit un montant plus élevé qu'en Picardie (635 €).



Les allocataires de certaines prestations en 2007, AEEH (7,2 pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans) et RMI (33,8 pour 1 000 ménages) sont moins nombreux dans le Compiégnois qu'en France métropolitaine (respectivement 9,6 ‰ et 39,4 ‰). Pour ces deux prestations, les trois communautés de communes présentent des valeurs inférieures à la communauté d'agglomération de Compiègne.



Le taux de chômage au recensement de la population 2006 est plus faible dans le Compiégnois qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (respectivement 10,5 % contre 12,1 % et 11,1 %), tout particulièrement dans les trois communautés de communes (8,7 %). De même, la proportion de chômeurs de longue durée est moins importante sur le pays que sur l'ensemble du territoire métropolitain.



La proportion de cadres est la deuxième plus élevée des pays de Picardie avec 16,5 %, supérieure à la France métropolitaine. Cette proportion est particulièrement élevée sur la communauté d'agglomération de Compiègne où elle représente près d'un emploi sur cinq.



Les densités de généralistes, spécialistes et dentistes sont équivalentes, voire supérieures, aux densités nationales, professionnels qui sont très majoritairement installés sur la communauté d'agglomération de Compiègne.



Le taux d'admissions en ALD pour affections psychiatriques de longue durée est significativement plus faible dans le Compiégnois (127,2 pour 100 000 en 2004-2005) qu'en France métropolitaine (169,8).



Compte tenu des établissements de soins situés dans le pays, la densité de lits de courte durée est supérieure à la moyenne nationale, même si ces établissements drainent une population venant d'autres pays de Picardie.

Points ni positifs ni négatifs



En 2003-2006, l'indice conjoncturel de fécondité (ICF) est de 1,86 enfant par femme dans le Compiégnois. L'Oise, la Picardie et la France métropolitaine ont des ICF plus élevés (respectivement 2,07 enfants par femme, 2,00 et 1,90). Mais, cela masque une disparité sur le pays entre la communauté d'agglomération de Compiègne et les trois autres EPCI (1,80 contre 2,14).



Les personnes âgées du Compiégnois sont moitié moins nombreuses à percevoir l'aide personnalisée d'autonomie (Apa) à domicile qu'au niveau national : 66,1 allocataires de l'Apa à domicile pour 1 000 personnes de 75 ans et plus au 31 décembre 2007 contre 127,4 ‰ en France entière.



Le taux de bénéficiaires de la CMU complémentaire est équivalent entre le pays et le niveau national (respectivement 67,3 ‰ et 67,8 ‰). Cette valeur globale masque cependant une différence importante entre les trois communautés de communes et la communauté d'agglomération dans un rapport de un sur trois (28,0 pour 1 000 habitants dans les trois communautés de communes et 90,5 pour la communauté d'agglomération de Compiègne).

Points positifs et négatifs



Le taux global d'admissions en ALD est de 1 908,5 nouveaux bénéficiaires pour 100 000 habitants contre 1 877,1 en France métropolitaine. La majorité des taux d'admissions en ALD et des taux de mortalité ne présente pas de différence significative avec la France métropolitaine, laissant entendre une situation sanitaire proche du niveau national, voire parfois meilleure (mortalité prématurée dans la communauté de commune Plaine d'Estrées et mortalité générale pour maladies cardio-vasculaires dans la communauté d'agglomération de Compiègne).



Les dépenses remboursables de soins reflètent les habitudes mais aussi l'offre disponible sur le territoire. Ainsi, les dépenses pour les consultations ou les visites de médecins généralistes sont plus faibles dans le Compiégnois qu'en région (respectivement 93 € et 17 € contre 103 € et 24 €), tandis que les dépenses de consultations de spécialistes y sont plus élevées (49 € contre 41 €) ainsi que les dépenses en actes dentaires (68 € contre 61 €). Pour l'ensemble des dépenses, celles-ci sont supérieures dans le pays du Compiégnois au reste de l'Oise mais inférieures au reste de la Picardie.



Le Compiégnois est également bien pourvu en maison de retraite. Avec 19 établissements et 1 015 places offertes au 31 août 2009, l'offre dans le Compiégnois (65,4 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus) est du niveau des moyennes régionale et nationale.



Le taux de participation à la campagne de dépistage organisé du cancer du sein est assez satisfaisant en regard des valeurs départementale et régionale (50,0 % des femmes de 50 à 74 ans contre 46,5 % dans l'Oise et 50,6 % en Picardie). Toutefois, la participation des femmes du Compiégnois demeure encore inférieure à celle de l'ensemble des Françaises même si elle est compensée sur l'est du pays par un recours au dépistage individuel.

Points négatifs



La mortalité générale est significativement supérieure dans le Compiégnois (970,4 pour 100 000 en 2000-2005) par rapport à la France métropolitaine (903,2). De même, cette surmortalité par rapport au niveau national se retrouve pour les tumeurs malignes (276,3 contre 256,9), les accidents vasculaires cérébraux (70,1 contre 62,1) et les causes de mortalité liées au tabac (149,9 contre 134,8).



Certaines différences masquent cependant des situations différentes suivant les EPCI, et parfois entre la communauté d'agglomération et les trois communautés de communes. Ainsi, la mortalité générale est supérieure sur les trois communautés de communes par rapport à la moyenne nationale, ce qui n'est pas retrouvé sur la communauté d'agglomération. C'est l'inverse, par contre, qui est observé pour la mortalité prématurée.



Le même constat est fait pour les deux premières causes de mortalité. Ainsi, les habitants de la communauté d'agglomération décèdent plus qu'au niveau national de cancers mais moins de maladies cardiovasculaires. C'est la tendance inverse qui est observé pour les trois communautés de communes.



La proportion d'accidents de circulation survenus dans le Compiégnois et dont le conducteur à une alcoolémie supérieure à 0,5 g d'alcool est plus élevée dans le pays que dans l'Oise et qu'en Picardie : 16,1 % contre respectivement 12,4 % et 13,5 %. Le taux de mortalité par accident de la circulation est plus élevé pour le regroupement des trois communautés de communes, notamment sur les communautés de communes Basse-Automne et canton d'Attichy (différence significative avec le niveau national : 16,2 pour 100 000 habitants contre 10,4).

Annexes

| | |
|---------|--|
| Page 56 | Affections de longue durée (ALD) |
| Page 56 | Taux standardisés |
| Page 56 | Test de significativité |
| Page 57 | Le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) |
| Page 57 | Le répertoire Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) |
| Page 57 | Les consommations de psychotropes |
| Page 57 | Les professionnels de santé exerçant en libéral |
| Page 58 | Carte des pays de Picardie |
| Page 58 | Carte des principales routes du Compiégnois |
| Page 58 | Carte des zones limitrophes du Compiégnois |
| Page 59 | Structures de prévention |
| Page 61 | Glossaire |

Affections de longue durée (ALD)

En cas d'affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le code de la Sécurité sociale prévoit la suppression du ticket modérateur normalement à la charge de l'assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites « de longue durée » (ALD) établie par décret (n°2004-1049 du 4 octobre 2004, JO du 5 octobre 2004) est la suivante :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;
- insuffisance médullaire et autre cytopénie chronique ;
- artériopathie chronique avec manifestation ischémique ;
- bilharziose compliquée ;
- insuffisance cardiaque grave, trouble du rythme grave, cardiopathie valvulaire grave, cardiopathie congénitale grave ;
- maladie chronique active du foie et cirrhose ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le VIH ;
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
- forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
- hémoglobinopathie, hémolyse, chronique constitutionnelle et acquise sévère ;
- hémophilie et affection constitutionnelle de l'hémostase grave ;
- hypertension artérielle sévère ;
- maladie coronaire ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- maladie d'Alzheimer et autres démences ;
- maladie de Parkinson ;
- maladie métabolique héréditaire nécessitant un traitement prolongé et spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
- paraplégie ;
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
- affection psychiatrique de longue durée ;
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
- sclérose en plaques ;
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
- spondylarthrite ankylosante grave ;
- suite de transplantation d'organe ;
- tuberculose active, lèpre ;
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Taux standardisés

Les taux bruts de mortalité sont le rapport entre le nombre de décès et la population du territoire concerné. Le défaut des taux bruts est que certains facteurs comme la structure d'âge de la population ne sont pas pris en compte.

Par conséquent, il n'est pas pertinent de comparer deux taux bruts de mortalité de territoires différents avec des populations différentes (par exemple comparer une communauté de communes à une autre communauté de communes ou avec le niveau national). En effet, comment interpréter des taux bruts de mortalité lorsque la première population est très âgée (où le risque de décéder est plus élevé) et que la seconde est jeune (où le risque de décéder est plus faible) ?

Pour pallier ce problème, les taux de mortalité, d'admissions en ALD et d'hospitalisations sont standardisés sur la structure d'âge d'une population de référence (ici, la France métropolitaine au 1^{er} janvier 2005 et la population au recensement 2006 pour les données d'hospitalisation) ; ils sont appliqués à toutes les populations étudiées. Ainsi, il devient possible de comparer les taux entre les territoires et entre les sexes.

Test de significativité*

Afin d'affirmer l'existence d'une sous-mortalité ou d'une surmortalité significative dans un pays par rapport à la France, un test de significativité peut être utilisé lorsque l'on calcule des taux standardisés : le test de la loi normale.

En comparant un taux de mortalité dans un pays au taux correspondant dans la France métropolitaine, et même en travaillant avec des unités statistiques qui sont des populations entières avec des caractéristiques fixes et non des échantillons, les taux de mortalité doivent être considérés comme aléatoires et les pays, de même que la Picardie, comme des échantillons d'une population parente ayant les mêmes caractéristiques. Par suite, il existe des fluctuations aléatoires des valeurs des taux calculés autour de vraies valeurs, et l'utilisation d'un test est alors justifiée.

En théorie d'échantillonnage, une valeur calculée à partir d'un échantillon est souvent présentée avec un intervalle de confiance et une probabilité (ou seuil de confiance) pour que la valeur réelle, dans la population parente, soit à l'intérieur de cet intervalle.

Si les intervalles de confiance de l'unité géographique d'analyse et de la France ne se recoupent pas, la différence est significative (sous- ou surmortalité suivant la valeur). Dans le cas contraire, il n'existe pas de différence significative entre l'unité géographique d'analyse et la France métropolitaine.

* Les tests de significativité ne sont calculés que par rapport à la France métropolitaine.

Le Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)

Le PMSI a été créé en 1996 afin de réduire les inégalités de ressources entre les établissements de santé. Depuis 2005, le PMSI participe à la mise en place de la tarification à l'activité (T2A) qui rémunère les hôpitaux selon leur activité de médecine, chirurgie, obstétrique ainsi que l'hospitalisation à domicile. Dans le secteur des soins de suite et de réadaptation (SSR), le PMSI est effectif depuis 2003. Concernant le secteur psychiatrique, le PMSI sera bientôt mis en place.

Introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, la tarification à l'activité (T2A) instaure un nouveau mode de financement des établissements de santé. Se substituant à la dotation globale de financement pour les établissements publics ou participant au service public hospitalier et à la tarification à la journée ou la prestation pour les cliniques privées, elle vise à harmoniser les modes de financement des secteurs public et privé.

La tarification à l'activité est un mode de financement qui vise à fonder l'allocation des ressources aux établissements de santé publics et privés sur la nature et le volume de leur activité réalisée, mesurée, pour l'essentiel, sur la base du classement de chaque séjour hospitalier dans l'un des groupes homogènes de malades (GHM) de la classification utilisée dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). À chaque GHM produit par l'établissement est alors appliqué le tarif correspondant, la liste de ces tarifs étant fixée et publiée au niveau national (Loi de Financement).

Avant la T2A, certains séjours hospitaliers étaient absents de cette base pour deux raisons : certains établissements ne répondaient pas (non-réponse totale de l'établissement), et certains établissements répondaient partiellement (non-réponse partielle de l'établissement). Il était alors nécessaire de redresser les données pour corriger ce défaut d'exhaustivité. La T2A a permis d'améliorer la qualité des données recueillies, le PMSI est maintenant relativement exhaustif.

En court séjour, MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), chaque séjour fait l'objet d'un Résumé de sortie standardisé (RSS) qui contient le diagnostic principal (diagnostic ayant généré la plus importante consommation de ressources), le diagnostic relié pour les prises en charge itératives, les diagnostics associés (significatifs ou documentaires), ainsi que les actes techniques.

Les diagnostics sont codés en CIM-10 (Classification internationale des maladies) et les actes techniques en CCAM (Classification commune des actes médicaux).

Si le séjour comporte des mutations dans différents services, chaque unité de soins remplit un Résumé d'unité médicale (Rum). L'ensemble des Rum est ensuite regroupé en RSS.

Les RSS sont regroupés en groupes homogènes de malades (GHM) contenant des données administratives, médicales et économiques. Pour chaque GHM, il peut y avoir un ou plusieurs GHS (groupe homogène de séjours) déterminant le tarif.

La base des RSS est anonymisée au niveau de l'établissement (RSA), puis centralisée dans les services de l'État. C'est l'Atih (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation) qui est chargée de la gestion de cette base de données et qui en assure la diffusion.

Le répertoire Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess)

Créé par la circulaire du 3 juillet 1979, le répertoire Finess a pour but de recenser en permanence les équipements des domaines sanitaires et sociaux. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) est responsable du répertoire. Les Drass et les Ddass en assurent la mise à jour.

Le répertoire comporte des données sur les établissements (publics ou privés) sanitaires (établissements hospitaliers, autres centres de soins, laboratoires et pharmacies), les établissements sociaux (personnes âgées, jeunes et adultes en situation de handicap, aide sociale à l'enfance, adultes en difficulté sociale) et les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.

Pour chaque établissement, le répertoire précise ses caractéristiques (numéro Finess, statut, tarification, organisme gestionnaire) et ses capacités d'accueil (public accueilli, nombre de lits et de places).

Les consommations de psychotropes

Les données de consommation de médicaments psychotropes ont été fournies par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie (Urcam). Ces données anonymisées correspondent à l'année 2006 et à la Picardie. Elles ne couvrent que les personnes affiliées au régime général, soit plus de huit personnes sur dix.

En pratique, les proportions de personnes ayant consommé un psychotrope sont calculées en prenant au dénominateur les assurés et leurs ayants droit et au numérateur ceux d'entre eux qui ont eu au moins un remboursement pour un psychotrope en 2006.

Les professionnels de santé exerçant en libéral


Les données concernant les professionnels de santé exerçant en libéral dans le Compiégnois proviennent d'une base de données interne à l'OR2S. Cette base de données a été créée à partir des bases de professionnels de santé existantes : le répertoire Adeli, la base Urcam et les pages jaunes. Un premier travail de comparaison a été facilité par l'utilisation du langage sql. Le répertoire Adeli, qui a servi de référence, a été comparé à la base de l'Assurance maladie.

Le résultat de cette comparaison a été ensuite mis en parallèle à la base des pages jaunes. Une fois ces comparaisons automatisées réalisées, une vérification manuelle a été effectuée pour rechercher essentiellement les doublons qui n'ont pu être pris en compte automatiquement. Finalement, la dernière étape de ce travail a été de contacter par téléphone un par un les professionnels de santé pour lesquels il y avait discordance.

Ce travail a permis de présenter une situation actualisée pour le pays du Compiégnois pour certains professionnels de santé. Toutefois, les validations sont encore en cours pour d'autres pays, ce qui explique les différences qui peuvent être mentionnées dans certains tableaux en termes de date de référence.


Carte des pays de Picardie

- 2 Grand Amiénois
- 4 Saint-Quentinois
- 5 Thiérache
- 6 Grand Laonnois
- 7 Clermontois - Plateau Picard
- 8 Sources et Vallées
- 9 Chaunois
- 10 Grand Creillois
- 11 Thelle Vexin-Sablons
- 12 Grand Beauvaisis
- 13 Sud de l'Oise
- 14 Soissonnais
- 15 Sud de l'Aisne
- 16 Compiégnois
- 17 Vallées Bresles et Yeres
- 18 Trois Vallées
- 19 Santerre - Haute Somme
- 20 Trait Vert - Santerre Initiatives




Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Carte des principales routes du Compiégnois



Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

Carte des zones limitrophes du Compiégnois



Géo Fla, © IGN Paris 2009, reproduction interdite

CC canton d'attichy**Vie libre/comité départemental de l'Oise**

6 rue de la pierre sautée
60350 Trosly Breuil
Tél : 03 44 42 53 78
Mail : didierdaroux@orange.fr
www.vielibre.org

Traces et compagnie

2 rue de la Nervaise
60170 Tracy le Mont

CA du Compiégnois**Al-anon/Alateen groupes familiaux Oise**

Espace le Puy du Roy
Rue Charles Faroux
60200 Compiègne
Tél : 03 44 87 10 03
Mail : al-anon@wanadoo.fr
http://assoc.wanadoo.fr/al-anon.alateen.france

Maison d'arrêt de COMPIEGNE / Ucsa

3 Avenue de la Résistance
BP 37
60321 Compiègne cedex
Tél : 03.44.20.82 74
Mail : secretariat.ma-compiegne@justice.fr

Association pour le dépistage des cancers dans l'Oise (Adcaso)

5 ter rue Clément Ader
ZAC de Mercières BP 80041
60321 Compiègne
Tél : 03 44 95 33 20
Mail : adcaso2@wanadoo.fr

Mission locale du pays compiégnais et du pays des sources

3 rue de l'Anthémis
60200 Compiègne
Tél : 03 44 36 34 44
Mail : missionlocale.compiegne@wanadoo.fr
www.missions-locales-picardie.org

Club cœur et santé de Compiègne et sa région

13 avenue du chemin de fer
60200 Compiègne
Tél : 03 44 83 36 84

Oise Alzheimer/antenne de Compiègne

5 square des Acacias
60200 Compiègne
Tél : 03 44 97 30 98
Mail : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Compagnie théâtrale Art k'ange

BP 20823
60208 Compiègne
Tél : 06 13 76 26 68
Mail : cieartkange@free.fr

Pôle de prévention et d'éducation des maladies cardio-vasculaires

22 rue de la Justice
60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 67 84
Mail : ppmcv.secretariat@ch-compiegne.fr
www.ch-compiegne.fr onglet : CHC hors les murs

Epicerie sociale La Passerelle (EACCE)

13 quai du clos des roses
60200 Compiègne
Tél : 03 44 86 32 25
Mail : eacce.lapasserelle@business.fr

Proscenium

16 rue de Saint-Hubert
60610 La Croix-Saint-Ouen
Tél : 03 44 41 22 63/06 08 50 49 10
Mail : colette.magnier@free.fr
www.proscenium-asso.com

Familles rurales-Fédération départementale de l'Oise

36 rue de l'Oise
60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 04 22 ou 03 44 20 03 50
Mail : fdfoise@wanadoo.fr
www.famillesrurales.org/oise

Solidarité et développement

18 rue Jules Méline
BP 60845
60208 Compiègne cedex
Tél : 03 44 92 22 10
Mail : soldev@9online.fr

Grandir Ensemble

46 Square de la Mare Gaudry
60200 Compiègne
Tl : 03 44 86 98 98
Mail : grandir.ensemble@wanadoo.fr
www.grandirensemble60.org

Union des fibromyalgies de Picardie

126 rue de l'Ecole
60880 Armacourt
Tél : 03 44 83 40 79/03 44 86 03 29
Mail : unionfibromyalgiespicardie@yahoo.fr

Unité d'éducation diabétologique/CH de Compiègne

CH de Compiègne - médecine interne, endocrinologie
Rue Henri Adnot
60200 Compiègne
Tél : 03.44.23.63.16
Mail : i.rohmer@ch-compiegne.fr

VIC PRODUCTION

16 rue Martel
60200 Compiègne
Tél : 03 44 86 24 93
Mail : info@vicprod.com
www.vicprod.com

Centre de planification et d'éducation familiale

Centre médico-social Impasse Lévêque
60280 Margny-lès-Compiègne
Tél : 03 44 83 35 34

Association des médiatrices interculturelles (Ami)

18 bis rue Winston Churchill
BP 60802
60208 Compiègne cedex
Tél : 03 44 20 48 24
Mail : ami.compiegne@wanadoo.fr

Bureau information jeunesse Centre municipal la Victoire

105 bis Rue Saint Joseph
60200 Compiègne
Tél : 03.44.20.71.09
Mail : bij.compiegne@mairie-compiegne.wanadoo.fr

Aftam accueil et formation

2 bis rue Hippolyte Bottier
BP 10751
60321 Compiègne
Tél : 03 44 40 42 41
Mail : oise.formation@aftam.asso.fr

Alcooliques anonymes (AA) Oise / Groupe de Compiègne

Espace du Puy du Roy
5 bis rue Charles Faroux
60321 Compiègne
Tél : 03 44 53 68 68
www.alcooliques-anonymes.fr

Association des sauveteurs de l'Oise

33 rue de Paris
60200 Compiègne

Centre d'animation culturelle de Compiègne et du Valois (Cac-CV)

Espace Jean Legendre
Place Briet Dauvigny
60200 Compiègne

Centre de planification et d'éducation familiale

Centre médico-social
1 place de la Croix blanche
60200 Compiègne
Tél : 03 44 86 54 50

Compagnie des lucioles

4 rue d'Humières
60200 Compiègne

Jusqu'à la mort aider la vie (Jalmalv) Compiègne

53 rue Saint-Lazare
60200 Compiègne
Tél : 03 44 86 55 69
Mail : jalmalvcompiegne@wanadoo.fr

Meles

Mairie
BP 60132
60200 Compiègne

RE BOND DIRE

17 Avenue Winston Churchill
60200 Compiègne
Tél : escoffier1@aol.com

MTVO

8 rue Nicéphore Niepce
ZAC de Mercières
60200 Compiègne
Tél : 03 44 38 5190
Mail : jp.bouhala@mtvo.org

CC Plaine d'Estrées**Club cœur et santé Compiègne et sa région**

39 rue du Jeu d'Arc
60680 Canly
Tél : 03 44 23 19 02
Mail : csimeoni@wanadoo.fr

Glossaire

AAH : Allocation aux adultes handicapés
 Adcaso : Association pour le dépistage du cancer du sein dans l'Oise
 Adeli : Automatisation des listes
 Adema 80 : Association pour le dépistage des maladies
 AEEH : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
 Aisne Préventis : Association de dépistage organisé des cancers dans le département de l'Aisne
 ALD : Affection de longue durée
 Ami : Association des médiatrices culturelles
 Apa : Allocation personnalisée d'autonomie
 API : Allocation parent isolé
 ARS : Agence régionale de santé
 Atih : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
 AVC : Accident vasculaire cérébral
 BCG : Bacille de Calmette et Guérin
 CA : Communauté d'agglomération
 Cac-CV : Centre d'animation culturelle de Compiègne et du Valois
 Caf : Caisse d'allocations familiales
 CAT : Centre d'aide par le travail
 CC : Communauté de communes
 CCAM : Classification commune des actes médicaux
 CépiDe : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm)
 CH : Centre hospitalier
 Cim : Classification internationale des maladies
 Cipas : Circonscription de la prévention et de l'action sociale
 CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
 CMU : Couverture maladie universelle (de base ou complémentaire)
 Cnamts : Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
 CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie
 Cram : Caisse régionale d'assurance maladie
 Das : Diagnostic associé significatif
 DEFM : Demandeurs d'emploi en fin de mois
 DGI : Direction générale des impôts
 Diact : Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (a succédé à la Datar)
 Drass : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
 Drees : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
 DRTEFP : Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 EACCE : Entr'aide Compiègne contre l'exclusion
 EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
 Finess : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
 Fnors : Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
 GHM : Groupe homogène de malades
 GHS : Groupe homogène de séjours
 ICF : Indice conjoncturel de fécondité
 IGN : Institut géographique national
 IME : Institut médico-éducatif
 Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
 Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
 InVS : Institut de veille sanitaire
 Ireps : Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (a succédé au Cres)
 Jalmalv : Jusqu'à la mort aider la vie
 MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique
 MSA : Mutualité sociale agricole
 MTVO : Médecins du travail de la Vallée de l'Oise
 PIJ : Point information jeunesse
 PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
 RMI : Revenu minimum d'insertion
 RSI : Régime social des indépendants
 RSS : Résumé de sortie standardisé
 Rum : Résumé d'unité médicale
 SSR : Soins de suite et de réadaptation
 T2A : Tarification à l'activité
 Ucsa : Unité de consultations et de soins ambulatoires
 Urcam : Union régionale des caisses d'assurance maladie
 USLD : Unité de soins de longue durée
 VADS : Voies aérodigestives supérieures

Ce travail est le fruit d'un partenariat engagé avec l'ensemble des institutions régionales dans le champ sanitaire et social et des institutions nationales productrices de données. Les indicateurs et données présentés portent le plus souvent sur la dernière année (ou période) disponible au moment du traitement. Ainsi, les données issues du recensement de la population de 2006 ont été intégrées le plus souvent possible dans les calculs d'indicateurs.

Ce document est le produit d'un travail d'équipe. Il a été préparé par :

- Anne-Sophie Bernin, Anne Ducamp, Nadège Thomas, Sophie Debuissier, Fabien Lhenry, Olav Favier, Sophie Pilleron, Béatrice Oliveux, Sylvie Bonin, Chantal Chivet, Michaël Mansion et Alain Trugeon de l'OR2S,

- Philippe Lorenzo et l'Ireps de Picardie de façon plus générale.

Par ailleurs, les auteurs tiennent à remercier l'Urcam de Picardie, tout particulièrement Olivier Zielinski, la Drass de Picardie et tous les organismes mentionnés dans les sources pour leurs contributions. Ils remercient également Fanny Boutigny-Hubert (Urcam de Picardie) et Didier Soyer (Observatoire régional de sécurité routière de Picardie) pour leur relecture attentive des parties les concernant directement.

Ce travail a été conséquent en termes de validation mais il se peut toujours que des erreurs se soient glissées. Les auteurs vous prient de les excuser et de les leur signaler. Celles-ci seront prises en compte et intégrées dans la version téléchargeable sur Internet.*

** une adresse mail est spécifiquement dédiée à vos remarques : diagnosticpays@or2s.fr*

*Ce document a été financé par le **conseil régional de Picardie**.*

11 mail Albert 1^{er}, BP 2616, 80026 AMIENS Cedex 1

*Conception et réalisation par l'**observatoire régional de la santé et du social de Picardie**.*

Faculté de médecine, 3 rue des Louvels, 80036 AMIENS Cedex 1

Crédits photos :

Copyrights

Logiciels

Microsoft® Office 2007, Adobe® InDesign CS3®

Géoconcept de Géoconcept SA, Adobe® Illustrator®

Police de caractères

Times New Roman, BethHand, Calisto MT

Réalisation PC

Imprimé en septembre 2009 à l'imprimerie DB Print Amiens



Une collection...

Diagnostics Territoriaux de santé
des pays de Picardie

Thiérache

Trois Vallées

Clermontois - Plateau Picard

Soissonnais

Compiégnois



PICARDIE

LA RÉGION

Conseil régional de Picardie
11 mail Albert 1^{er} - BP 2616
80026 Amiens Cedex 1