

Regard santé

l'aire de Marle

→ Présentation de l'aire

L'aire de Marle comprend trois cantons : Crécy-sur-Serre, Marle, Sains-Richaumont, tous situés dans l'Aisne.

Au recensement de 2006, cette aire compte **19 610 habitants**, soit une densité de 32,7 habitants au km². Cette densité est particulièrement faible au regard de celles du département (72,9 h/km²), de la région (97,6 h/km²) et du niveau national (112,9 h/km²).

Cette population compte 32,8 % de **personnes de moins de 25 ans** au recensement de 1999, soit autant que dans l'Aisne (32,3 %) et qu'en Picardie (33,1 %) et plus qu'en France métropolitaine (30,9 %).

Les personnes de **75 ans et plus** sont aussi nombreuses dans l'aire de Marle que dans l'Aisne et qu'en France métropolitaine (respectivement 7,3 % *versus* 7,3 % et 7,7 %) et plus nombreuses qu'en Picardie (6,6 %).


En revanche, les 25-59 ans sont moins nombreux que dans les autres entités géographiques : 45,0 % dans l'aire contre 46,6 % dans l'Aisne, 47,8 % Picardie et 47,8 % en France métropolitaine.

En 2003-2006, l'**indice conjoncturel de fécondité** est de 2,58 enfants par femme, indice plus élevé que dans le département de l'Aisne (2,10), la Picardie (2,00) et la France métropolitaine (1,90).

Parmi les 983 naissances domiciliées entre 2003 et 2006 dans l'aire de Marle, 13 sont issues de **mères mineures**, soit un taux de 13,2 pour 1 000. Ce taux est supérieur à ceux de l'Aisne (12,3 ‰), de la Picardie (9,6 ‰) et de la France métropolitaine (5,6 ‰).

Entre 2001 et 2004, sur les 932 naissances dont la mère réside dans l'aire, 63,4 % ont eu lieu à Laon, 19,3 % à Saint-Quentin et 7,7 % à Reims (Marne).

De même, les décès concernant les habitants de l'aire sont constatés pour 61,2 % d'entre eux à Laon. On constate 11,1 % des décès à Reims et 8,6 % à Saint-Quentin.



Sources : Insee, OR2S

SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



L'Assurance
Maladie

Service Médical
Nord Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Des revenus moyens faibles mais moins d'allocataires de la CMU et du RMI

Plus de la moitié des foyers fiscaux de l'aire est **non imposable** en 2005 (53,9 %), ce qui est légèrement supérieur au taux de l'Aisne (52,4 %), mais au-dessus des taux de la Picardie (47,8 %) et de la France métropolitaine (46,2 %).

Le **revenu moyen** des habitants de l'aire est de 14 090 € en 2005 : là encore, ce revenu est proche de ceux du département (14 681 €) et de la région (15 938 €), mais il est inférieur au revenu moyen national (17 165 €).

L'aire de Marle compte 22,2 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de l'Aisne (22,7 ‰) et de peu supérieur au taux de la Picardie (21,3 ‰).

En revanche, concernant l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) en 2005, l'aire recense 154,7 bénéficiaires pour 1 000 personnes de plus de 75 ans ; ce taux étant supérieur à ceux de l'Aisne (129,6 ‰), de la Picardie (117,7 ‰) et de la France métropolitaine (149,4 ‰).

En 2005, l'aire de Marle dénombre 1 006 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1. Parmi eux, 50,1 % sont des hommes, ce qui est inférieur à la proportion axonnaise (53,2 %) et picarde (51,9 %).


Les 25-49 ans (60,9 %) sont en proportion équivalente à celle de l'Aisne (60,4 %) mais moins nombreux que dans la région (61,6 %) ; les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus rassemblent 12,8 % des DEFM de l'aire, soit moins que dans l'Aisne (14,2 %) et la Picardie (13,6 %). Par contre, les DEFM de moins de 25 ans (26,2 %) sont plus nombreux que dans l'Aisne (25,4 %) et qu'en Picardie (24,8 %).

La proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté est forte : 40,6 % versus 38,5 % pour l'Aisne et 33,2 % pour la Picardie.


L'aire de Marle compte peu d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI) en 2004 : 28,5 pour 1 000 ménages, contre 42,3 ‰ dans l'Aisne et en Picardie.

Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 103,8 pour 1 000 familles monoparentales en 2005 et 9,7 pour 1 000 couples) que dans l'Aisne (140,2 ‰ et 15,8 ‰) et la Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

De même, on dénombre 24,0 allocataires du RMI pour 1 000 personnes de 25-49 ans dans l'aire, ce qui est bien inférieur aux taux relevés dans l'Aisne (35,6 ‰), et la Picardie (33,4 ‰).



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S



Sources : Cpm, MSA, RSI, Insee, OR2S

La **CMU de base** concerne moins de personnes dans cette aire qu'ailleurs : 6,6 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005 contre 10,7 ‰ dans l'Aisne, 16,1 ‰ en Picardie et 22,1 ‰ en France métropolitaine.

Concernant la **CMU complémentaire**, la proportion d'allocataires est également moindre : 64,9 ‰ versus 100,7 ‰ dans le département, 89,6 ‰ en région et 67,5 ‰ au niveau national.

→ Professionnels de santé

Une densité de généralistes très faible et des médecins vieillissants


En novembre 2006, l'aire de Marle compte 12 **médecins généralistes**, soit une densité de 6,1 pour 10 000 habitants. Cette densité est plus faible que dans l'Aisne (8,9), la Picardie (9,7) et la France métropolitaine (11,2).

Parmi ces médecins, un quart sont des femmes. Cette proportion est plus importante que dans le département (22,1 %) mais inférieure aux niveaux régional (27,6 %) et national (29,4 %).

Les généralistes ont en moyenne 51,4 ans : ils sont en moyenne plus âgés que les médecins généralistes de Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans) mais d'un âge équivalent à leurs confrères de l'Aisne (51,1 ans).

Cinq d'entre eux ont 55 ans et plus, soit 41,7 % de l'effectif (35,1 % dans le département, 31,5 % dans la région et 32,2 % en métropole).

L'aire de Marle ne compte qu'un seul **médecin spécialiste** (psychiatre) : il a 61 ans. Les villes de Saint-Quentin et Laon, à proximité, fournissent la demande en spécialistes pour cette aire.




Sources : Adeli, Insee, OR2S

En avril 2007, 3 **chirurgiens dentistes** étaient installés dans l'aire, soit une densité de 1,5 dentistes pour 10 000 habitants contre 4,3 pour l'Aisne, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine. L'âge moyen de ces dentistes est de 43,0 ans, ce qui est inférieur à la moyenne de la région (48,2 ans) mais proche de la métropole (47,8 ans) et du département (47,2 ans). Aucun dentiste n'a plus de 55 ans et tous sont des hommes.

Les **auxiliaires médicaux** sont 24 dans l'aire de Marle en avril 2007, soit une densité de 12,1 pour 10 000 habitants, ce qui est plus faible que dans le département (14,7 %), la région (13,8 %) et la métropole (21,9 %). La majorité de ces auxiliaires sont des femmes (83,3 % contre 71,0 % dans la région et 69,0 % au niveau national). Leur moyenne d'âge est de 47,5 ans, cette moyenne étant supérieure à la moyenne de l'Aisne (44,1 ans), de la Picardie (43,5 ans) et de la France métropolitaine (43,6 ans). Enfin, 7 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus, soit 29,2 % de l'effectif.

L'aire de Marle compte 19 **infirmiers** libéraux en avril 2007 ce qui représente une densité de 9,6 pour 10 000 habitants. Cette densité est supérieure à la densité de l'Aisne (8,5), de la Picardie (7,1) mais inférieure à celle de la France métropolitaine (11,2 pour 10 000 habitants). Tous sont des femmes, leur moyenne d'âge est de 47,4 ans, ce qui est supérieur à la moyenne du département (44,3 ans), de la région (44,6 ans) et de la métropole (44,9 ans). Cinq de ces infirmières ont 55 ans et plus, soit 26,3 % de l'effectif.

On dénombre 6 **pharmacies** dans l'aire de Marle, soit une densité de 3,1 pour 10 000 habitants, ce qui est légèrement inférieur à la densité de l'Aisne (3,5) et de la Picardie (3,3).



Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 51,9 % des patients de l'aire de Marle ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait dans l'aire.


En revanche, concernant les médecins spécialistes, quasi absents de l'aire, les patients s'orientent majoritairement vers les villes de Laon et de Saint-Quentin : respectivement 67,6 % et 8,9 % des consultations d'ophtalmologie ; 39,6 % et 19,6 % des consultations de gynécologie-obstétrique ; 79,8 % et 7,9 % des consultations de gynécologie médicale ; 56,5 % et 16,6 % des consultations de dermatologie.

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale et prématurée plus élevée qu'en Picardie et France métropolitaine

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Marle est de 73,6 ans pour les hommes et 80,4 ans pour les femmes : ces espérances de vie sont assez proches de celles relevées dans le département pour les hommes (73,3 ans) mais inférieures d'un an pour les femmes (81,4 ans).

Elles sont inférieures à la région (74,1 ans et 81,7 ans) et aux valeurs de la France métropolitaine : respectivement 75,9 ans pour les hommes et 83,2 ans pour les femmes, soit 1,3 ans et 3,2 ans de moins que les espérances de vie au plan national.



Taux standardisé de mortalité générale en 2000-2004 (pour 100 000 habitants)

Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

L'aire de Marle connaît, en 2000-2004, une **mortalité générale** de 1 151,4 pour 100 000 habitants (208 décès annuels, 101 femmes et 107 hommes) contre 1 098,1 dans l'Aisne, 1 052,7 en Picardie, et 911,3 en France métropolitaine.

De même, la **mortalité prématurée** est de 269,2 pour 100 000 habitants ce qui est légèrement inférieur au taux de l'Aisne (277,8) mais plus élevé que la Picardie (262,7) et la métropole (221,5).

Plus de la moitié des décès survenant dans l'aire de Marle est due aux **tumeurs malignes** et aux **maladies de l'appareil circulatoire** : 57,8 % des décès masculins et 55,1 % des décès féminins.

Les hommes sont plus touchés que les femmes par les tumeurs malignes (30,7 % *versus* 21,5 %) et les femmes meurent plus que les hommes des maladies circulatoires (33,7 % *versus* 27,2 %).

La troisième cause de mortalité est identique chez les hommes et les femmes de l'aire : ils meurent à 9,1 % et 6,5 % de **causes externes** (accidents, empoisonnements, suicides).

L'aire de Marle affiche un taux de mortalité par **suicide** de 21,2 pour 100 000 habitants ce qui est moins que les taux relevés dans l'Aisne (22,8) et la Picardie (23,1) mais plus que le taux relevé en France métropolitaine (18,0 pour 100 000 habitants). Les **accidents de la voie publique** de l'aire engendrent une mortalité bien supérieure à celle du département, de la région et de la France métropolitaine : 22,6 pour 100 000 habitants contre respectivement 15,2, 14,3 et 10,8 décès sur les routes pour 100 000 habitants.

En 2004-2005, on compte 5 115 **séjours hospitaliers** par an pour des habitants de l'aire, soit un taux de 263,0 pour 1 000. Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (291,5 ‰) et de Picardie (289,3 ‰).

Concernant les **nouvelles admissions en affection de longue durée (ALD)**, en 2000-2004, les tumeurs et le diabète représentent les deux principaux motifs d'admission à la fois chez les hommes et les femmes : à eux deux, ils totalisent 40,5 % des nouvelles ALD.

Le **diabète** compliqué induit à terme des affections neurologiques, ophtalmologiques, rénales ou cardiovasculaires. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le nombre de nouvelles personnes admises au titre d'une ALD pour le diabète dans l'aire de Marle est de 317,2 pour 100 000 habitants, soit 60 nouveaux cas par an entre 2004 et 2005. Cette proportion est inférieure à celle de l'Aisne (345,7) et supérieure à celles de la Picardie (311,4) et de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	35	20,5	1	59	28,2	1
Diabète	29	16,6	2	31	15,1	2
Hypertension artérielle sévère	20	11,4	3	13	6,4	6
Pathologies cardiaques graves	18	10,3	4	17	8,0	4
Affections psychiatriques de longue durée	16	9,1	5	12	5,8	7
Maladie coronaire	9	5,3	6	18	8,9	3
Maladie d'Alzheimer et autres démences	8	4,5	7	3	1,4	10
Accident vasculaire cérébral	5	3,2	8	6	3,0	8
Artériopathies chroniques	4	2,5	9	16	7,7	5
Polyarthrite rhumatoïde grave	3	1,9	10	3	1,3	11
Insuffisance respiratoire chronique	2	0,9	15	5	2,5	9
Autres causes de nouvelle admission	24	13,9	-	24	11,7	-
Total	173	100		208	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des taux élevés d'admissions en ALD pour les pathologies liées à l'appareil circulatoire

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné, en 2004-2005, 127 nouvelles admissions par an en ALD (71 hommes et 56 femmes), soit un taux de 673,5 pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur à ceux de l'Aisne (605,1), de la Picardie (602,0) et de la France métropolitaine (586,1).

Les séjours hospitaliers liés à ces pathologies représentent un taux d'hospitalisations de 28,6 pour 1 000 habitants de l'aire (556 séjours par an entre 2004 et 2005) contre 29,7 ‰ dans le département et 27,8 ‰ dans la région.

La mortalité pour ces pathologies dans l'aire de Marle est de 362,2 pour 100 000 habitants (64 décès annuels dont 34 femmes et 30 hommes), soit un taux plus élevé que dans l'Aisne (331,5), la Picardie (314,2) et la France métropolitaine (271,8).


Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, 127 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an ont lieu pour des **cardiopathies ischémiques**, soit un taux de séjours de 6,4 pour 1 000 dans l'aire en 2004-2005 (4,8 pour 1 000 séjours chez les femmes et 8,2 ‰ chez les hommes) contre 6,8 ‰ dans le département et 6,1 ‰ dans la région.

En 2005, cette pathologie représente un taux de mortalité de 105,6 pour 100 000 habitants (19 décès annuels dont 8 femmes et 11 hommes). Ce taux est plus élevé que celui de l'Aisne (90,8), de la Picardie (86,6) et plus encore que celui de la France (74,6).

En 2004-2005, 12 personnes ont bénéficié annuellement d'une admission en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (AVC), soit un taux de bénéficiaires de 61,0 pour 100 000 personnes, ce qui est supérieur aux taux de l'Aisne (55,0) et de la Picardie (56,1), mais équivalent à celui de la France métropolitaine (60,5).

Le taux de séjours hospitaliers est légèrement plus élevé dans l'aire en 2004-2005 : 3,1 ‰ (soit 61 séjours par an) contre 2,7 ‰ dans l'Aisne et 2,8 ‰ en Picardie.

Par ailleurs, on dénombre 14 décès annuels sur cette période suite à un AVC : ceci représente un taux de mortalité de 75,5 pour 100 000 personnes, taux équivalent à l'Aisne (74,0), mais supérieur à la région (69,6) et à la métropole (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 35 admissions annuelles en ALD dont 18 femmes et 17 hommes, soit un taux de nouveaux bénéficiaires de 183,2 pour 100 000 habitants, ce qui est plus que dans le département (150,4), la région (149,7) et qu'au niveau national (140,1).

Pour la **maladie coronaire**, le taux de nouveaux bénéficiaires est de 144,5 pour 100 000 habitants : ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (161,8) et de la Picardie (150,0) et légèrement supérieur au taux de la France métropolitaine (140,8). Ceci correspond à 27 nouvelles admissions annuelles en ALD pour ces maladies dont 9 femmes et 18 hommes.

Concernant l'**hypertension artérielle**, 33 personnes (20 femmes et 13 hommes) ont bénéficié annuellement d'une ALD pour cette pathologie entre 2004-2005, soit un taux de 178,6 pour 100 000 personnes. Ce taux est supérieur aux autres entités géographiques (149,0 pour l'Aisne, 164,4 pour la Picardie, 170,2 pour la France métropolitaine).

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Des taux d'admissions en ALD plus forts qu'au plan national mais une mortalité moindre pour le cancer de la prostate

L'aire de Marle a un taux d'admissions pour **tumeurs malignes** de 494,5 pour 100 000 habitants, soit 94 nouvelles admissions en ALD par an (35 femmes et 59 hommes) : ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (525,4) et de la Picardie (497,8) mais il dépasse celui de la métropole (483,1).

De même, le taux de mortalité est de 283,1 pour 100 000 *versus* 295,9 pour l'Aisne, 286,6 pour la Picardie et 257,8 pour la France métropolitaine. En 2000-2004, les cancers ont provoqué 52 décès par an, dont 21 femmes et 31 hommes.


En 2004-2005, 383 séjours par an ont été recensés pour tumeurs malignes pour des habitants de l'aire, soit un taux de 19,2 pour 1 000. Ce taux est plus faible que dans l'Aisne (23,0 ‰) et qu'en Picardie (24,3 ‰).



Le nombre de nouveaux bénéficiaires en ALD pour le **cancer de la prostate** s'élève à 18 par an entre 2004 et 2005, dont 13 hommes de 65 ans et plus. Le taux d'admissions en ALD pour cette pathologie est de 208,4 pour 100 000 habitants dans l'aire, soit moins que dans l'Aisne (240,7) et la Picardie (209,5) mais plus qu'au niveau national (198,0). Ceci se retrouve parmi les hommes de 65 ans et plus avec un taux de 959,6 pour 100 000 habitants dans l'aire *versus* 1 122,9 dans le département, 969,5 en région et 915,3 en France métropolitaine.

Le taux d'hospitalisations pour ce cancer est de 3,3 pour 1 000 hommes de l'aire, ce qui est plus faible que dans l'Aisne (4,3 ‰) et qu'en Picardie (3,9 ‰). Ceci représente 29 séjours par an entre 2004 et 2005 pour l'aire de Marle.

De même, le taux de mortalité pour le cancer de la prostate est de 36,7 pour 100 000 habitants, soit moins que dans l'Aisne (59,2), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1). Il a provoqué 5 décès par an de 2000 à 2005 dans l'aire (dont 2 personnes de 65 ans et plus).




En 2004-2005, 18 femmes ont été admises en ALD par an pour un **cancer du sein**, 11 avaient moins de 65 ans. Le taux d'admissions en ALD correspondant est de 180,1 pour 100 000, ce qui est plus que dans le département (171,4), la région (172,6) et qu'au niveau national (175,3).

Il en est de même pour la mortalité liée à ce cancer : 42,3 pour 100 000 dans l'aire de Marle, soit plus que dans l'Aisne (36,5), la Picardie (37,3) et la France métropolitaine (33,2).

Par contre, le taux de séjours hospitaliers pour ce cancer est de 4,1 pour 1 000 femmes (41 séjours par an) ce qui est proche des taux de l'Aisne et de la Picardie (4,4 ‰ pour chaque).

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Concernant le **cancer colorectal** on retrouve, comme pour le cancer du sein, un taux d'admissions en ALD plus important dans l'aire (50,4 pour 100 000 habitants en 2004-2005) qu'au niveau départemental (48,7), régional (46,8) et national (48,4). Ce cancer représente annuellement 9 nouvelles admissions en ALD, 4 femmes et 5 hommes.

Le taux de séjours hospitaliers dans l'aire est inférieur à ceux des autres entités géographiques (1,5 ‰ en 2004-2005 contre 2,3 ‰ dans l'Aisne et en Picardie). Ceci correspond à un taux de 1,3 ‰ chez les femmes et 1,8 ‰ chez les hommes pour un total de 30 séjours par an.

En revanche, à la différence du cancer du sein, la mortalité par cancer colorectal, en 2000-2004, est moindre dans l'aire (27,7 contre 30,1 dans l'Aisne, 28,9 en Picardie) et est équivalente au niveau national (27,8). Avec le cancer du sein, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par tumeur maligne chez la femme (12 décès en 2000-2004), avec un taux de 21,1 pour 100 000 personnes.

Le taux de séjours pour **cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)** s'élève à 1,7 ‰ contre 1,4 ‰ dans le département et 1,5 ‰ dans la région, soit 34 séjours par an entre 2004 et 2005.

Le taux de mortalité pour cette pathologie est de 22,3 pour 100 000, ce qui est moins que dans l'Aisne (23,5), équivalent à la région (22,2) mais supérieur à la France métropolitaine (17,3). Le nombre de décès pour cette pathologie de 2000 à 2004 est de 4 décès par an.

En 2004-2005, 37 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire (dont 34 hommes) ont lieu annuellement pour des **cancers de la trachée, des bronches et du poumon**, soit un taux de 1,8 pour 1 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne et de la Picardie (respectivement 2,5 ‰ et 2,8 ‰).

La mortalité pour ce cancer est de 43,5 pour 100 000 dans l'aire de Marle. Ce taux est inférieur à ceux du département (51,8), de la région (50,0) et du niveau national (44,0). De 2000 à 2004, ce cancer a engendré 8 décès par an dans cette aire, dont 7 hommes.

→ Asthme

En 2006, 1 185 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (570 femmes et 615 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,2 % des assurés** de l'aire de Marle. L'Aisne (10,8 %) et la Picardie (10,3 %) ont des taux proches.

Les femmes de l'aire ont un taux moins élevé que celui des hommes (8,4 % et 10,2 %).

Cette différence homme - femme se retrouve chez les 0-12 ans avec un taux d'assurés ayant reçu un traitement contre l'asthme de 13,5 % chez les garçons et de 7,2 % chez les filles. Les taux féminins sont inférieurs aux taux du département et de la région (10,3 % et 10,1 %) tandis que les taux masculins sont proches (14,8 % dans l'Aisne et 13,9 % en Picardie).

Ceci représente 251 jeunes de l'aire de Marle (82 filles et 169 garçons), soit un taux global de 10,4 % (12,6 % dans le département et 12,0 % en région).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Des admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer faibles mais plus de prescriptions de psychotropes



L'aire de Marle compte 28 nouvelles admissions annuelles en ALD pour **affections psychiatriques de longue durée** entre 2004 et 2005. Le taux correspondant est de 146,6 pour 100 000 habitants. Il est inférieur aux taux de l'Aisne (155,6) et de la France métropolitaine (169,8) mais supérieur à celui de la Picardie (131,9). Ce taux est de 125,9 chez les hommes et de 166,5 chez les femmes.

Le taux de séjours hospitaliers concernant les troubles mentaux et comportementaux est de 4,9 pour 1 000 (4,2 ‰ chez les femmes et 5,4 ‰ chez les hommes) *versus* 6,4 ‰ dans l'Aisne et 7,5 ‰ en Picardie. Ceci correspond à 95 séjours par an entre 2004 et 2005.

En 2004-2005, 11 admissions en ALD par an sont engendrées par la **maladie d'Alzheimer**. Le taux correspondant est de 60,7 pour 100 000 habitants, soit moins que dans le département (89,0), la région (89,5) et le niveau national (86,2).

Ce taux est de 72,7 pour les femmes et 45,1 pour les hommes.

En 2006, 36 personnes de 70 ans ou plus ont reçu un **traitement anti-Alzheimer**, soit 2,6 ‰ des assurés sociaux du régime général de l'aire. Ce taux est plus faible que ceux de l'Aisne (3,2 ‰) et de la Picardie (2,8 ‰). Les femmes sont davantage traitées que les hommes : 3,2 ‰ des femmes de 70 ans ou plus (3,6 ‰ dans le département et 3,2 ‰ en région) contre 1,7 ‰ des hommes de 70 ans ou plus (respectivement 2,3 ‰ et 2,1 ‰).



En 2006, 26,2 ‰ des assurés sociaux de l'aire ont eu **au moins une fois un remboursement pour un psychotrope** contre 24,7 ‰ dans l'Aisne et 24,1 ‰ en Picardie ; soit 3 169 personnes (30,7 ‰ des femmes et 20,7 ‰ des hommes).

Les **anxiolytiques** sont la classe de psychotropes la plus remboursée.

Pour cette classe, la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006 est de 17,5 ‰ (21,6 ‰ des femmes et 12,7 ‰ des hommes), soit plus que dans l'Aisne (16,6 ‰) et la Picardie (16,4 ‰). En tout, 2 146 personnes ont eu une prescription d'anxiolytiques dans l'aire en 2006.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 8,6 ‰ des assurés sociaux (11,0 ‰ des femmes et 5,8 ‰ des hommes). Cette proportion est équivalente à celle de l'Aisne (8,6 ‰) et de la Picardie (8,3 ‰). Globalement, ce sont 1 048 personnes qui sont concernées.

La proportion d'assurés sociaux remboursés au moins une fois pour un **neuroleptique** est de 2,0 ‰, ce qui est équivalent à l'Aisne (1,9 ‰) mais supérieur à la Picardie (1,6 ‰) ; 243 personnes de l'aire de Marle sont concernées en 2006.

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et Méthadone) et de **traitement de dépendance à l'alcool** concernent moins de 1,0 ‰ des assurés de l'aire : respectivement 0,2 ‰ (25 personnes), 0,3 ‰ (39 personnes) et 0,3 ‰ (44 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Un faible taux de dépistage du cancer du sein

Durant la campagne de **dépistage organisé du cancer du sein** de 2005-2006, 1 124 mammographies ont été effectuées dans l'aire de Marle, soit une participation de 42,2 % des femmes de 50-74 ans.


Ce taux de participation est proche de celui de l'Aisne (40,6 %) mais inférieur à ceux de la Picardie (45,5 %) et de la France entière (47,1 %).

De même, 652 **frottis** ont été réalisés dans l'aire en 2006, soit un pourcentage de 18,2 % des femmes de 25-64 ans. Ce taux est meilleur que dans l'Aisne (16,4 %) mais reste inférieur à la moyenne régionale (20,8 %).



Durant la période 2000 à 2003, près d'un quart des femmes (24,5 %) ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales**. Ce pourcentage est élevé au regard de ceux de l'Aisne (21,5 %) et de la Picardie (15,7 %).

De même, le pourcentage de **prématurés** nés sur cette même période est de 7,4 %, ce qui est plus important que dans l'Aisne (6,1 %) et la Picardie (5,6 %).



Le taux de **vaccination contre la grippe** des personnes de 65 ans ou plus inscrites au régime général atteint 70,9 %, ce qui est plus que dans l'Aisne (67,0 %) et la Picardie (64,9 %).

En tout, ce sont 1 150 personnes qui ont été vaccinées. Les femmes sont d'ailleurs moins protégées que les hommes : 68,3 % des femmes (65,9 % dans le département et 64,2 % en région) contre 75,5 % des hommes (respectivement 68,9 % et 66,1 %).

De même, les habitants de l'aire âgés de moins de 65 ans et admis en ALD sont davantage vaccinés contre la grippe par rapport à l'Aisne et à la Picardie (53,3 % contre 51,3 % et 46,7 %).

Les femmes sont cette fois davantage vaccinées que les hommes : 55,4 % des femmes (52,2 % dans le département et 47,6 % en région) contre 52,1 % des hommes (respectivement 50,9 % et 46,1 %).

En 2006, 87,6 % des enfants de l'aire ont été vaccinés contre la **rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit moins que dans l'Aisne (91,3 %), et la Picardie (89,2 %).

Concernant le **BCG**, le taux de vaccination atteint 89,4 % des enfants ce qui est plus que dans le département (88,5 %) et la région (84,6 %).


Près de neuf enfants sur dix de l'aire sont vaccinés (89,4 %) contre la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est inférieur à ceux de l'Aisne (92,9 %) et de la Picardie (91,3 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est de 70,8 %. Ce pourcentage est supérieur à ceux de l'Aisne (58,2 %) et de la Picardie (52,7 %).

Parmi les enfants de 12 ans de l'aire de Marle, 42,9 % ont **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste, et/ou un stomatologue** en 2005-2006. Cette proportion est plus élevée que dans les autres entités géographiques : 41,2 % pour l'Aisne, 36,9 % pour la Picardie.

Ils sont 33,2 % à avoir subi une intervention (30,0 % dans l'Aisne, 27,4 % en Picardie) : 39 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle mécanique, scellement prophylactique), 19 des actes de chirurgie, et 49 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S

L'aire de Marle présente des indicateurs sociaux assez défavorables par rapport à la Picardie ou la France métropolitaine :


- un revenu moyen annuel inférieur ;
- une proportion de chômeurs de longue durée plus importante ;
- une faible densité de logements sociaux (plus de deux fois moins importante).

En revanche, l'aire compte peu d'allocataires du RMI et de la CMU.

Par ailleurs, il y a davantage de bénéficiaires de l'APA à domicile tandis que le taux de bénéficiaires pour l'aide ménagère est équivalent à la région.

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Les indicateurs concernant la mortalité et les ALD pour tumeurs malignes apparaissent proches entre l'aire, la région et le pays (rapports de 1,0).

En revanche, le rapport entre ces zones est supérieur à 1 pour la mortalité générale et les maladies cardiovasculaires, ce qui montre que cette aire est davantage touchée par ces pathologies que la Picardie et la France métropolitaine (rapports de 1,1 et de 1,3 pour les ALD entre l'aire et le niveau national).

Enfin, concernant la mortalité générale et l'ensemble des ALD, les rapports sont de 1,0 avec la Picardie et de 1,1 avec la France métropolitaine.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Les taux de dépistage organisé du cancer du sein et de frottis réalisés sont inférieurs à la moyenne picarde (rapports de 0,9).

En ce qui concerne la vaccination contre le ROR, les enfants de cette aire sont légèrement moins vaccinés qu'en région.

En revanche, la vaccination antigrippale est meilleure au sein de l'aire (rapport de 1,1). Les consultations chez le dentiste et les soins réalisés y sont, en outre, également plus importants qu'en Picardie.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Marle apparaît plus défavorisée sur le plan socio-économique que la Picardie et la France métropolitaine du fait de revenus moyens nettement inférieurs.

De plus, les taux de mortalité générale (1 151,4 pour 100 000) ainsi que de mortalité prématurée (269,2 pour 100 000) sont plus importants dans cette aire que dans la région (respectivement 1 052,7 et 262,7).

Les taux d'admissions en ALD pour cancer du sein (180,1) et de mortalité (42,3) sont supérieurs à la Picardie (172,6 et 37,3) et à la France métropolitaine (175,3 et 33,2).

Parallèlement, la participation au dépistage organisé du cancer du sein (42,2 %) et les pourcentages de frottis réalisés (18,2 %) sont plus faibles.

En revanche, la mortalité par cancer de la prostate (36,7) se révèle inférieure aux plans régional (53,8) et national (45,1) alors que les taux d'admissions en ALD pour cette pathologie sont élevés (208,4 pour 100 000 contre 209,5 en Picardie et 198,0 en métropole).

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, l'aire de Marle compte 381 bénéficiaires de l'affection de longue durée (ALD) par an, soit 2 020,4 bénéficiaires pour 100 000 habitants. Cette proportion est légèrement inférieure à celle de l'Aisne (2 039,0) mais supérieure à celles de la région (1 946,5) et de la métropole (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 73,6 ans pour les hommes et de 80,4 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Marle connaît des mortalités générale et prématurée supérieures à la Picardie et à la France métropolitaine : respectivement 1 151,4 et 269,2 pour 100 000 habitants contre 1 052,7 et 262,7 en région et 911,3 et 221,5 au niveau national.

Maladies de l'appareil circulatoire

La mortalité par maladies cardiovasculaires est plus importante dans l'aire de Marle (362,2 pour 100 000) qu'en Picardie (314,2) et qu'en France métropolitaine (271,8). Cette tendance est la même pour la mortalité par cardiopathie ischémique et par accident vasculaire cérébral.

Les taux d'admissions en ALD pour pathologies cardiaques graves et hypertension artérielle y sont également supérieurs. Seul le taux d'admissions en ALD pour maladie coronaire est inférieur au taux de Picardie mais reste plus élevé que le niveau national.

Cancers

Les taux d'admissions en ALD et de mortalité pour tumeurs malignes (494,5 et 283,1) sont supérieurs dans l'aire de Marle à ceux relevés en France métropolitaine (483,1 et 257,8 pour 100 000 habitants).

Le cancer de la prostate a un taux d'admissions proche du taux picard mais supérieur au taux national (208,4 *versus* 209,5 et 198,0). La mortalité pour ce cancer est moindre dans l'aire de Marle (36,7 pour 100 000) par rapport à la région (53,8) et au niveau national (45,1).

Concernant les cancers du sein et du côlon-rectum, les taux d'admissions en ALD sont encore une fois supérieurs aux niveaux régional et national. Mais, si la mortalité par cancer du sein est plus importante dans l'aire (42,3) par rapport à la Picardie (37,3) et à la France (33,2 pour 100 000), elle apparaît équivalente voire inférieure à la région et à la métropole pour le cancer colorectal (27,2 *versus* 28,9 et 27,8).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Le taux d'admissions en ALD pour ces pathologies est plus bas dans l'aire de Marle (146,6 pour 100 000 en 2004-2005) qu'en France métropolitaine (169,8) mais plus élevé qu'en Picardie (131,9). Pour la maladie d'Alzheimer, l'aire se situe sous les taux de la région et du niveau national : 60,7 contre 89,5 et 86,2. Toutefois, la consommation de psychotropes est plus importante dans l'aire qu'au niveau régional.

Prévention

Dépistages : le taux de participation à la campagne de dépistage du cancer du sein est moindre qu'en Picardie et qu'en France entière (42,2 % contre 45,5 % et 47,1 %). La tendance est la même pour le pourcentage de frottis réalisés (18,2 % contre 20,2 % en région).

Périnatalité : 24,5 % des femmes ont eu moins de 7 consultations prénatales, ce qui est plus que dans l'Aisne (21,5 %) et la Picardie (15,7 %).

Vaccination : les taux de vaccinations concernant le ROR (87,6 %) et le DTCP (89,4 %) sont inférieurs à ceux relevés dans l'Aisne et en Picardie ; cette tendance s'inverse quant aux vaccinations contre l'hépatite B (70,8 %) et le BCG (89,4 %). La couverture vaccinale contre la grippe est meilleure dans l'aire pour les personnes de 65 ans ou plus (70,9 % contre 64,9 % en Picardie), et également pour celles inscrites en ALD (53,3 % contre 46,7 %).

Actes dentaires : les enfants de 12 ans ont davantage consulté un professionnel de soins dentaires (42,9 %) que ceux du département (41,2 %) ou de la région (36,9 %) alors que la densité de chirurgiens-dentistes est presque deux fois moindre que celle du département.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en janvier 2009
Il a été rédigé et mis en page par Emilie Pluquet, Anne Ducamp,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).